

図. 平成28年(2016)年1月～平成29(2017)年3月までに環境水サーベイランスによって検出されたエンテロウイルス

調査地点 (n=検体数、調査期間)	2016年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2017年1月	2月	3月	
北海道・東北・新潟	A (n=36, 8月から1月)								CB1 CB2			CB2				
	B (n=90, 1月から3月)							E6	CB5 E6	CB5 E6	CB5 E6	CB5 E6	NPEV NPEV	E6	CB5	
	C (n=120, 1月から3月)	CB5				E3		E3 E6	E6	E6		E6	E6			
	D (n=150, 1月から3月)	CB5	CB3 CB5	CB5				CB5	CB5	CB5	CB5			E3 E6	E3	E3
関東・甲信・静岡	E (n=90, 1月から3月)					CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	E6	E6	CB5 E6
	F (n=150, 1月から3月)					CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	E6	E6	E6
	G(2カ所) (n=300, 1月から3月)	CB3	CB3			CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	E6	E6	E6
	H(2カ所) (n=108, 7月から3月)							CB1 CB5 E3	E3			E3	E6	E6	E6	E25
東海北陸	I (n=120, 1月から3月)								E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E3 E18 E18 E25
	J (n=72, 1月から12月)	CB5	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	
	K (n=90, 1月から3月)								E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6
近畿	L(3カ所) (n=640, 1月から3月)					CB1	CB1	CB1	CB1	CB1						
	M(3カ所) (n=270, 1月から3月)	CB3	CB3			CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3	CB3
	N (n=180, 1月から3月)					CB5		CB5				CB4				
	O (n=90, 1月から3月)	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5	CB5
	P (n=72, 4月から3月)							CB1	CB5	CB5			E6	E6		
九州	Q(2カ所) (n=72, 7月から12月)							Sabin 3	NPEV	NPEV	NPEV	NPEV	NPEV	NPEV		
	R (n=36, 6月から11月)							CB5	CB5	CB5	CB5	CB3	CB1			

2カ月以上検出されたエンテロウイルスは灰色で示した
 CA: Coxsackievirus, group A E: Echovirus CB: Coxsackievirus, group B NPEV: non-polio/ enterovirus

