

## 急性呼吸器感染症サーベイランス週報:

2025年第47週(2025年11月17日~2025年11月23日)

Acute Respiratory Infection Surveillance Weekly Report: Epidemiologic Situational Awareness

Week 47, 2025

本報は全国から報告された急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection、以下、ARIという)のサーベイランス報告を精査してまとめ、地方自治体等で感染症対策に従事する皆様や国民の皆様に、広く疫学情報を提供・還元することを目的としています。ARI、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、小児科および内科からなる急性呼吸器感染症定点から、RSウイルス感染症、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、小児科定点から報告されています。患者サーベイランスでは集計日に直近1週間のデータを集計し、それ以外は、以前のデータを再掲しています。病原体サーベイランスでは、集計日に全ての期間のデータを集計しています。週ごとの「傾向(トレンド)」と「水準(レベル)」を踏まえ、感染の流行の状況について、解釈を行っています。巻末に本報に関する注意事項を記載しています。なお報告数は暫定値であり、変更の可能性があることにご注意下さい。

### 今週の状況(概要):

2025年第47週(11月17日~11月23日)におけるARIの定点当たり報告数は103.38(報告数396,446例)であり、前週(11月10日~11月16日)と比較して増加した。各感染症の定点当たり報告数では、インフルエンザは51.12、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は2.38、COVID-19は1.64、RSウイルス感染症は0.73、咽頭結膜熱は0.28、ヘルパンギーナは0.06であった。インフルエンザは14週連続で増加し、前週比は1.35であった。また、新規入院患者数は、インフルエンザは2,055例で前週と比較して589例増加した。COVID-19は884例で前週と比較して44例増加した。

年齢群別にみると、報告数が最も多い年齢群は、インフルエンザでは0-9歳、COVID-19では10-59歳、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナでは1-4歳、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎では5-14歳であった。ARIの定点当たり報告数が前週を上回った都道府県は46件であった。また各感染症の定点当たり報告数が多かった上位3都道府県は、インフルエンザでは宮城県、福島県、岩手県であった。COVID-19では新潟県、秋田県、北海道であった。RSウイルス感染症では福井県、奈良県、島根県であった。咽頭結膜熱では島根県、鹿児島県、長崎県であった。ヘルパンギーナでは大分県、岩手県、長野県であった。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎では愛媛県、福岡県、新潟県であった。

2025年第47週に検体が採取されて集計時点までに報告されたもののうち、インフルエンザウイルスA型は47件、SARS-CoV-2は4件、RSウイルスは2件、インフルエンザウイルスB型は1件であった。インフルエンザウイルスA型はA/H3が43件、亜型不明が4件、インフルエンザウイルスB型はビクトリア系統であった。

## 目次

今週の状況(概要): .....	1
1. 患者サーベイランス .....	3
1.1. 全国の定点当たり報告数.....	3
1.2. 全国の年齢群別報告数.....	5
1.3. 都道府県別の定点当たり報告数.....	8
1.4. 全国のインフルエンザおよび COVID-19 の新規入院患者数.....	21
2. 病原体サーベイランスの状況.....	22
2.1. 全国の病原体別報告数.....	22
2.2. SARS-CoV-2 ゲノムサーベイランス.....	26
注意事項 .....	27
地域の定義 .....	27
参考サイト .....	28
参考 1: 検体採取週ごとの全自動遺伝子解析装置等による検査結果.....	29
参考 2: 各感染症の週ごとの都道府県別定点当たり報告数.....	30

## 1. 患者サーベイランス


### 1.1. 全国の定点当たり報告数

2025年第47週におけるARIは、3,835力所の急性呼吸器感染症定点から報告され、定点当たり報告数は103.38(報告数396,446例)であった(図1)。前週比は1.09であった。

急性呼吸器感染症定点から報告されたインフルエンザは51.12(報告数196,895例)、COVID-19は1.64(報告数6,302例)であった(図1A)。なお、報告定点数は3,852力所であった。

小児科定点から報告されたRSウイルス感染症は0.73(報告数1,699例)、咽頭結膜熱は0.28(報告数665例)、ヘルパンギーナは0.06(報告数135例)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は2.38(報告数5,565例)であった(図1B)。なお、報告定点数は2,340力所であった。最近の動向としては、インフルエンザは14週連続で増加、COVID-19は3週連続で減少、RSウイルス感染症は6週連続で減少、咽頭結膜熱は前週から横ばい、ヘルパンギーナは4週連続で減少、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は前週から減少した。

図1: 週ごとのARIの定点当たり報告数



出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2025年4月7日~2025年11月23日)

図 1A: 週ごとのインフルエンザおよび COVID-19 の定点当たり報告数





図 1B: 週ごとの感染症別の定点当たり報告数



出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2024年10月14日~2025年11月23日)

注)報告数は、当該週のIDWRで還元したデータの再掲である。

注)定点数の変更をうけて、2025年第14週と第15週の間にスペースと点線を入れ、棒グラフに濃淡をつけて区別している。


注)2025年4月7日(第15週)より、感染症発生動向調査事業実施要綱上の定点の選定基準が変更され、インフルエンザ/COVID-19定点(約5,000医療機関)から急性呼吸器感染症定点(約3,000医療機関)に変更、小児科定点は約3,000医療機関から約2,000医療機関に変更された。

## 1.2. 全国の年齢群別報告数

2025年第47週に定点から報告されたARIの報告数を年齢群別にみると、0-9歳では223,958例(前週比1.08)、10-59歳では147,189例(前週比1.10)、60歳以上は25,299例(前週比1.10)であった(図2)。

各感染症の年齢群別報告数の推移をみると、インフルエンザはすべての年齢群で増加し、COVID-19はすべての年齢群で減少した(表1A)。またRSウイルス感染症は0歳、5-14歳では減少、1-4歳では横ばい、15歳以上では増加であった。咽頭結膜熱は0歳、5-14歳では減少、1-4歳、15歳以上では増加であった。ヘルパンギーナは0-4歳では減少、5-14歳では増加、15歳以上では横ばいであった。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は0-4歳、15歳以上では減少、5-14歳では横ばいであった(表1B)。週ごとの年齢群別報告数を図2Aおよび図2Bに示す。なお、インフルエンザ及びCOVID-19の60歳以上はそれぞれ6,657例、2,433例であり、うち80歳以上はそれぞれ1,422例、983例であった。

図2: 週ごとのARIの年齢群別報告数



出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2025年4月7日~2025年11月23日)

図 2A: 週ごとのインフルエンザおよび COVID-19 の年齢群別報告数





図 2B: 週ごとの感染症別の年齢群別報告数



出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2024年10月14日~2025年11月23日)

注)報告数は、当該週のIDWRで還元したデータの再掲である。

注)定点数の変更をうけて、2025年第14週と第15週の間にスペースと点線を入れ、棒グラフに濃淡をつけて区別している。

注)2025年4月7日(第15週)より、感染症発生動向調査事業実施要綱上の定点の選定基準が変更され、インフルエンザ/COVID-19定点(約5,000医療機関)から急性呼吸器感染症定点(約3,000医療機関)に変更、小児科定点は約3,000医療機関から約2,000医療機関に変更された。

表1A: 当該週におけるインフルエンザおよびCOVID-19の年齢群別報告数

年齢群	インフルエンザ	COVID-19
0-9歳	103,241 (1.39)	929 (0.81)
10-59歳	86,997 (1.30)	2,940 (0.83)
60歳以上	6,657 (1.51)	2,433 (0.90)
計	196,895 (1.35)	6,302 (0.85)

表1B: 当該週における感染症別の年齢群別報告数

年齢群	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	ヘルパンギーナ	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
0歳	485 (0.89)	38 (0.90)	8 (0.42)	21 (0.91)
1-4歳	1,121 (0.96)	466 (1.12)	88 (0.75)	1,435 (0.93)
5-14歳	82 (0.92)	150 (0.75)	36 (1.09)	3,841 (0.98)
15歳以上	11 (1.22)	11 (1.38)	3 (1.00)	268 (0.93)
計	1,699 (0.94)	665 (1.00)	135 (0.78)	5,565 (0.96)

出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2025年11月17日~2025年11月23日)

注)カッコ内の数値は前週比であり、前週の報告数は当該週のIDWRで還元したデータを用いた。なお、年齢階級別報告数の詳細についてはIDWR(定点把握の対象となる5類感染症ページ)で還元しているので参照のこと。

注)前週の報告数が0であった場合は、前週比の欄に「—」と表記する。

### 1.3. 都道府県別の定点当たり報告数

2025年第47週のARIの定点当たり報告数の上位3都道府県は、岩手県が163.05で最も多く、次いで群馬県が159.09、さらに埼玉県が152.94であった(図3A)。定点当たり報告数が前週を上回った都道府県は46件であった(表2)。定点当たり報告数は49.66~163.05であった(図4)。

定点当たり報告数が多かった上位3都道府県は、インフルエンザでは宮城県、福島県、岩手県であった。

COVID-19では新潟県、秋田県、北海道であった。RSウイルス感染症では福井県、奈良県、島根県であった。咽頭結膜熱では島根県、鹿児島県、長崎県であった。ヘルパンギーナでは大分県、岩手県、長野県であった。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎では愛媛県、福岡県、新潟県であった(表3)。インフルエンザの定点当たり報告数が30を上回った都道府県は39件であり全国的な流行となっている。また50を上回った都道府県は21件であった(図3B)。

表2: 当該週における都道府県別ARIの定点当たり報告数

都道府県	報告数	定点当たり報告数	前週比
北海道	17,359	103.95	1.11
青森県	5,467	105.13	1.28
岩手県	6,848	163.05	1.16
宮城県	7,969	144.89	1.03
秋田県	2,529	101.16	1.16
山形県	4,316	113.58	1.02
福島県	7,260	151.25	1.18
茨城県	8,369	123.07	1.10
栃木県	7,112	151.32	1.17
群馬県	7,159	159.09	1.07
埼玉県	26,764	152.94	0.99
千葉県	21,303	118.35	1.04
東京都	43,287	103.81	1.03

都道府県	報告数	定点当たり報告数	前週比
神奈川県	30,514	128.21	1.06
新潟県	5,797	111.48	1.19
富山県	6,341	134.91	1.14
石川県	4,927	104.83	1.07
福井県	2,460	63.08	1.22
山梨県	2,540	72.57	1.10
長野県	8,861	113.60	1.22
岐阜県	3,122	69.38	1.20
静岡県	11,466	83.09	1.11
愛知県	19,997	122.68	1.11
三重県	6,667	95.24	1.21
滋賀県	5,529	95.33	1.15
京都府	6,991	109.23	1.10
大阪府	19,396	66.65	1.02
兵庫県	15,868	96.76	1.05
奈良県	3,564	84.86	1.14
和歌山県	3,554	78.98	1.07
鳥取県	2,351	81.07	1.05
島根県	1,566	78.30	1.04
岡山県	5,069	101.38	1.15
広島県	7,598	80.83	1.11
山口県	7,117	112.97	1.14
徳島県	1,928	56.71	1.11
香川県	3,115	77.88	1.09
愛媛県	3,888	108.00	1.05
高知県	1,887	49.66	1.12
福岡県	9,842	81.34	1.08

都道府県	報告数	定点当たり報告数	前週比
佐賀県	1,780	74.17	1.07
長崎県	4,913	96.33	1.18
熊本県	5,807	80.65	1.19
大分県	7,037	121.33	1.22
宮崎県	2,040	72.86	1.22
鹿児島県	4,763	83.56	1.16
沖縄県	2,409	53.53	1.10

出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2025年11月17日~2025年11月23日)

注)前週の報告数は、当該週のIDWRで還元したデータを用いた。

注)前週の報告数が0であった場合は、前週比の欄に「—」と表記する。


表3: 当該週における感染症別定点当たり報告数の上位3都道府県

順位	インフルエンザ	COVID-19	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	ヘルパンギーナ	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	
1	都道府県	宮城県	新潟県	福井県	島根県	大分県	愛媛県
	定点当たり報告数	89.42	4.85	1.76	1.00	0.28	6.21
2	都道府県	福島県	秋田県	奈良県	鹿児島県	岩手県	福岡県
	定点当たり報告数	86.71	4.28	1.67	0.94	0.26	5.30
3	都道府県	岩手県	北海道	島根県	長崎県	長野県	新潟県
	定点当たり報告数	83.43	3.54	1.64	0.90	0.24	4.57

出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2025年11月17日~2025年11月23日)


注)定点当たり報告数が同値であった場合には、都道府県番号の昇順により記載する。

図 3A: 当該週における都道府県別 ARI の定点当たり報告数




出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2025年11月17日~2025年11月23日)


図 3B: 当該週における各感染症の都道府県別定点当たり報告数




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱



ヘルパンギーナ




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2025年11月17日~2025年11月23日)


図 4: 週ごとの都道府県別 ARI の定点当たり報告数




福島県




茨城県




栃木県




群馬県




埼玉県




千葉県




**東京都**




**神奈川県**




**新潟県**




**富山県**




**石川県**




**福井県**




**山梨県**




**長野県**




**岐阜県**



**静岡県**




**愛知県**




**三重県**




**滋賀県**




**京都府**




**大阪府**




**兵庫県**




**奈良県**




**和歌山県**




鳥取県




島根県




岡山県




広島県




山口県




徳島県




香川県




愛媛県




高知県




福岡県




佐賀県




長崎県




### 熊本県




### 大分県




### 宮崎県



### 鹿児島県



### 沖縄県



出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2025年4月7日~2025年11月23日)


注)報告数は、当該週のIDWRで還元したデータの再掲である。

## 1.4. 全国のインフルエンザおよび COVID-19 の新規入院患者数

2025年第47週に基幹定点から報告された、新規入院患者数の推移を図5に、年齢群別報告数を表4に示す。インフルエンザは2,055例で前週と比較して589例増加した。COVID-19は884例で前週と比較して44例増加した。

年齢群別でみると、インフルエンザでは0-9歳で887例、10-59歳で344例、60-69歳で110例、70-79歳で255例、80歳以上で459例であった。COVID-19では0-9歳で39例、10-59歳で60例、60-69歳で74例、70-79歳で242例、80歳以上で469例であった。前週と比べてインフルエンザはすべての年齢群で増加した。COVID-19は0-9歳では横ばい、10-59歳では減少、60-79歳では増加、80歳以上では横ばいであった。

図5: 基幹定点医療機関から報告されたインフルエンザおよびCOVID-19の新規入院患者数



出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2024年10月14日~2025年11月23日)

表 4: 当該週における基幹定点医療機関から報告された新規入院患者数

年齢群	インフルエンザ	COVID-19
0-9 歳	887 (1.37)	39 (1.05)
10-59 歳	344 (1.32)	60 (0.80)
60-69 歳	110 (1.22)	74 (1.09)
70-79 歳	255 (1.36)	242 (1.20)
80 歳以上	459 (1.63)	469 (1.02)
計	2,055 (1.40)	884 (1.05)

出典: 感染症発生動向調査(2025 年 11 月 26 日時点, データ範囲: 2025 年 11 月 17 日~2025 年 11 月 23 日)

注)カッコ内の数値は前週比であり、前週の報告数は当該週の IDWR で還元したデータを用いた。なお、年齢階級別報告数の詳細については IDWR(定点把握の対象となる 5 類感染症ページ)で還元しているので参照のこと。

注)前週の報告数が 0 であった場合は、前週比の欄に「—」と表記。


## 2. 病原体サーベイランスの状況

### 2.1. 全国の病原体別報告数

急性呼吸器感染症病原体定点(以下、ARI 病原体定点)で 2025 年第 47 週に採取され、集計時点までに報告された検体数は 84 件であった。そのうちインフルエンザウイルス A 型が 47 件、インフルエンザウイルス B 型が 1 件、SARS-CoV-2 が 4 件、RS ウィルスが 2 件陽性であった(図 6)。インフルエンザウイルス A 型は A/H3 が 43 件、亜型不明が 4 件、インフルエンザウイルス B 型はビクトリア系統であった。病原体別の陽性率は、インフルエンザウイルス A 型が 56.0%、インフルエンザウイルス B 型が 1.2%、SARS-CoV-2 が 4.8%、RS ウィルスが 2.4% であった(図 7)。インフルエンザウイルス A 型の陽性率は高い値で上昇が続いている。

第42週(10月13日～10月19日)に採取された検体は概ね結果の登録が反映されており、その数は北海道・東北地方では74件、関東地方では299件、北陸地方では50件、東海地方では28件、近畿地方では90件、中国地方では89件、四国地方では23件、九州・沖縄地方では38件であった。最も多く検出された病原体は、北海道・東北地方、関東地方、北陸地方、近畿地方、中国地方、四国地方ではライノ／エンテロウイルス、東海地方ではSARS-CoV-2、九州・沖縄地方ではRSウイルスであった(図8)。また検体採取週ごとの医療機関における全自動遺伝子解析装置等による検査結果を参考表に示す。第47週はインフルエンザウイルスA(亜型不明)が2件、インフルエンザウイルスBが1件登録され、第46週はインフルエンザウイルスA/H3、ライノ／エンテロウイルス、クラミジア・ニューモニクスが新たに追加された。

図6: 検体採取週ごとの病原体別報告数



出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2025年4月7日～2025年11月23日)

注)報告週ではなく検体採取週で集計していることに注意が必要である。

注)集計時点における報告数であるため、過去の週報で掲載された値とは必ずしも一致しないことに注意が必要である。


注)1つの検体から複数の病原体が検出された場合は、検出された全ての病原体を計上している。

注)ライノ／エンテロウイルスは、ライノウイルスまたはエンテロウイルスが検出されたものである。

注)その他は、凡例に示されている病原体以外が検出されたものである。

注)検査結果が検出なし、また検査結果の掲載がない週及び地域については、病原体が検出されなかった場合もあるが、検査項目によっては未実施の場合も含まれることに注意が必要である。

図 7: 検体採取週ごとの病原体別陽性率




出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2025年4月7日~2025年11月23日)


注)陽性率は、対象病原体の検査実施検体数を分母として算出((陽性数／検査実施数)×100)される。


注)報告週ではなく検体採取週で集計していることに注意が必要である。

注)集計時点における報告数であるため、過去の週報で掲載された値とは必ずしも一致しないことに注意が必要である。

図 8: 検体採取週ごとの全国および地域別、病原体別報告数







出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2025年4月7日~2025年11月23日)

注)報告週ではなく検体採取週で集計していることに注意が必要である。

注)集計時点における報告数であるため、過去の週報で掲載された値とは必ずしも一致しないことに注意が必要である。

注)1つの検体から複数の病原体が検出された場合は、検出された全ての病原体を計上している。

注)ライノ／エンテロウイルスは、ライノウイルスまたはエンテロウイルスが検出されたものである。

注)その他は、凡例に示されている病原体以外が検出されたものである。

注)検査結果が検出なし、また検査結果の掲載がない週及び地域については、病原体が検出されなかった場合もあるが、検査項目によっては未実施の場合も含まれることに注意が必要である。

## 2.2. SARS-CoV-2 ゲノムサーベイランス

※今週の掲載はありません。

## 注意事項

本報では、急性呼吸器感染症定点および小児科定点としてあらかじめ指定された医療機関から週単位で報告された患者数を全国および都道府県ごとに集計した数値を用いている。都道府県別あるいは性別・年齢階級別報告数の詳細については感染症発生動向調査週報(IDWR)を参照されたい。なお、本報およびIDWRに掲載されている数値は暫定値であるため、年報での数値とは必ずしも一致しない。

患者サーベイランスの集計には感染症発生動向調査に報告されたデータのうち直近1週間は集計日時点のデータを、それ以前は最初の集計時点のデータを再掲している。遅れて報告されたり、修正されたりする場合があるため、集計値は暫定値であることに注意が必要である。

週ごとの感染症の動向は定点当たり報告数を用いて評価し、年齢群別の動向は報告数を用いて評価している。

病原体サーベイランスの集計では、全ての週に関して集計時点のデータを掲載している。自治体/地方衛生研究所によって集められた検体に対する病原体検査項目が異なることがある。また、自治体/地方衛生研究所によって検査実施および報告に要する日数が異なるため、検体採取週における病原体検出数は遅れて報告される、あるいは修正されることがあり集計値は暫定値であることに注意が必要である。この点を考慮して地域別の検出病原体数などの集計は、5週前の数字を用いて評価している。

急性呼吸器感染症定点は、内科定点に比べ小児科定点が多く選択されている。定点から報告されたインフルエンザ、COVID-19症例に占める各年齢群の割合については、小児に偏る可能性がある。一方、経時的な流行全体の傾向(トレンド)と水準(レベル)の把握、年齢群ごとの傾向と水準の評価の観点においては影響を与えない。

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

従来の警報・注意報は保健所ごとの報告数を用いて検討・設計されており、定点数の設計および定点医療機関が変更された2025年4月7日以降の患者サーベイランスに直ちに当てはめることはできない。急性呼吸器感染症定点の運用時でのインフルエンザをはじめとする各感染症の警報・注意報といったアラートについてはデータの蓄積の上で検討を進める。なお、このような限界を理解したうえで従前の警報・注意報をコミュニケーションとして使用することを妨げるものではない。

急性呼吸器感染サーベイランスは2025年4月から開始されており、報告数のレベルの評価にはデータの蓄積を要する。その動向の推移を注視していく必要がある。

## 地域の定義

北海道・東北地方: 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東地方: 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

北陸地方: 新潟県、富山県、石川県、福井県

東海地方: 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近畿地方: 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国地方: 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国地方: 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄地方: 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

## 参考サイト

### ●感染症発生動向調査週報(IDWR)ページ

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

### ●病原微生物検出情報(IASR)ページ

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

### ●国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 感染症情報提供サイト

<https://id-info.jihs.go.jp/>

・インフルエンザ

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/a/influenza/index.html>

・新型コロナウイルス感染症

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/sa/covid-19/index.htm>

・RS ウィルス感染症

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/alphabet/rs/010/rs-intro.html>

・咽頭結膜熱

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/a/adeno/index.html>

・ヘルパンギーナ

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/herpangina/index.html>

### ●厚生労働省 感染症情報

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html)

・急性呼吸器感染症(ARI)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

・急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスに係る具体的な方針について (PDF: 1096KB)

<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001272561.pdf>

・インフルエンザ(総合ページ)

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html)

・新型コロナウイルス感染症について

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)

・RS ウィルス感染症 Q&A(令和6年5月 31 日改訂)

[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs\\_qa.html](https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs_qa.html)

・咽頭結膜熱

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/pcf.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/pcf.html)

・ヘルパンギーナ

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/herpangina.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/herpangina.html)

### ●新型コロナウイルスのゲノムサーベイランス(検疫検体:入国者検疫検体を含む)について

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/45/532/article/030/index.html>

### ●SARS-CoV-2 変異株について

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/sa/covid-19/180/flu2-1-1.html>

### ●都道府県番号について (PDF: 68KB)

<https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/07/dl/tp0727-1d.pdf>

## 参考 1: 検体採取週ごとの全自動遺伝子解析装置等による検査結果

全自动遺伝子解析装置を設置している医療機関における病原体検査の結果をモニタリングするために、任意の医療機関の協力により集められた検査結果である。


病原体	第 42 週	第 43 週	第 44 週	第 45 週	第 46 週	第 47 週
インフルエンザウイルス A/H1	0	0	0	0	0	0
インフルエンザウイルス A/H1-2009	1	0	0	0	0	0
インフルエンザウイルス A/H3	1	0	3	0	1	0
インフルエンザウイルス A(亜型不明)	0	4	6	2	4	2
インフルエンザウイルス B	0	0	1	0	0	1
SARS-CoV-2	4	6	4	0	0	0
RS ウィルス	8	3	4	6	2	0
パラインフルエンザウイルス 1	2	0	2	1	0	0
パラインフルエンザウイルス 2	1	2	2	0	0	0
パラインフルエンザウイルス 3	0	2	0	0	0	0
パラインフルエンザウイルス 4	0	0	0	0	0	0
パラインフルエンザウイルス(型不明)	0	1	1	0	0	0
ヒトライノウイルス／エンテロウイルス	7	9	10	5	4	0
ヒトメタニューモウイルス	0	2	1	0	0	0
アデノウイルス	2	2	0	1	0	0
コロナウイルス HKU1	0	0	0	0	0	0
コロナウイルス NL63	0	0	0	1	1	0
コロナウイルス 229E	0	0	0	0	0	0
コロナウイルス OC43	0	0	0	0	0	0
百日咳菌	0	0	0	0	0	0
パラ百日咳菌	0	0	0	0	0	0
クラミジア・ニューモニク	0	0	0	0	1	0
マイコプラズマ・ニューモニク	3	1	2	1	3	0

出典: 感染症発生動向調査(2025 年 11 月 26 日時点, データ範囲: 2025 年 10 月 13 日～2025 年 11 月 23 日)


注) 医療機関からの任意の協力による報告であるため報告数は参考値である。第 42 週から第 47 週にかけてご協力いただいた医療機関は、20 医療機関である。

注) ライノ／エンテロウイルスは、ライノウイルスまたはエンテロウイルスが検出されたものである。


## 参考 2: 各感染症の週ごとの都道府県別定点当たり報告数




## 宮城県




## 秋田県




## 山形県




## 福島県




## 茨城県




## 栃木県




群馬県




埼玉県




千葉県




## 東京都




## 神奈川県




## 新潟県




## 富山県




## 石川県




## 福井県




## 山梨県




## 長野県




## 岐阜県




## 静岡県




## 愛知県




## 三重県




## 滋賀県




## 京都府




## 大阪府




## 兵庫県




## 奈良県




## 和歌山県




## 鳥取県




## 島根県




## 岡山県




## 広島県




## 山口県




## 徳島県




香川県




愛媛県




高知県




## 福岡県




## 佐賀県




## 長崎県




## 熊本県




## 大分県




## 宮崎県



## 鹿児島県



## 沖縄県



出典: 感染症発生動向調査(2025年11月26日時点, データ範囲: 2024年10月14日~2025年11月23日)

注)報告数は、当該週のIDWRで還元したデータの再掲である。

注)定点数の変更をうけて、2025年第14週および第15週の間に点線を入れ、濃淡で区別している。

注)2025年4月7日(第15週)より、感染症発生動向調査事業実施要綱上の定点の選定基準が変更され、インフルエンザ/COVID-19 定点(約5,000医療機関)から急性呼吸器感染症定点(約3,000医療機関)に変更、小児科定点は約3,000医療機関から約2,000医療機関に変更された。