

急性呼吸器感染症サーベイランス週報:

2026 年第 26 週(2026 年 6 月 22 日~2026 年 6 月 28 日)

Acute Respiratory Infection Surveillance Weekly Report: Epidemiologic Situational Awareness

Week 26, 2026

本報は全国から報告された急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection、以下、ARI という)のサーベイランス報告を精査してまとめ、地方自治体等で感染症対策に従事する皆様や国民の皆様に、広く疫学情報を提供・還元することを目的としています。ARI、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、小児科および内科からなる急性呼吸器感染症定点から、RS ウイルス感染症、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、小児科定点から報告されています。患者サーベイランスでは集計日に直近 1 週間のデータを集計し、それ以外は、以前のデータを再掲しています。病原体サーベイランスでは、集計日に全ての期間のデータを集計しています。週ごとの「傾向(トレンド)」と「水準(レベル)」を踏まえ、感染の流行の状況について、解釈を行っています。巻末に本報に関する注意事項を記載してあります。なお報告数は暫定値であり、変更の可能性があることにご注意下さい。

今週の状況(概要):

2026 年第 26 週(6 月 22 日~6 月 28 日)における ARI の定点当たり報告数は 47.47(報告数 176,883 例)であり、前週(6 月 15 日~6 月 21 日)と比較して減少した。ARI の定点当たり報告数が前週を上回った都道府県は 12 件であった。各感染症の定点当たり報告数では、COVID-19 は 1.08、インフルエンザは 0.08、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は 2.25、ヘルパンギーナは 1.15、咽頭結膜熱は 0.54、RS ウイルス感染症は 0.34 であった。年齢群別にみると、報告数が最も多かった年齢群は、インフルエンザでは 10-59 歳、COVID-19 では 0-9 歳、RS ウイルス感染症、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナでは 1-4 歳、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎では 5-14 歳であった。また、新規入院患者数は、インフルエンザは 14 例で前週と比較して横ばいであった。COVID-19 は 115 例で前週と比較して 25 例減少した。

2026 年第 26 週に検体が採取されて集計時点までに報告されたもののうち、SARS-CoV-2 および RS ウイルスは 1 件、インフルエンザウイルス A 型およびインフルエンザウイルス B 型は 0 件であった。

2026 年 7 月 1 日時点で、2026 年 5 月における病原体検出あり検体は 1,363 件、検出なしは 658 件であった。最も多かった病原体はライノ/エンテロウイルスであり、789 件が陽性であった。

目次

今週の状況(概要):.....	1
1. 患者サーベイランス	3
1.1. 全国の定点当たり報告数	3
1.2. 全国の年齢群別報告数	5
1.3. 都道府県別の定点当たり報告数	8
1.4. 全国のインフルエンザおよび COVID-19 の新規入院患者数.....	21
2. 病原体サーベイランスの状況.....	22
2.1. 全国の病原体別報告数	22
2.2. SARS-CoV-2 ゲノムサーベイランス.....	26
注意事項.....	27
地域の定義.....	27
参考サイト	28
参考 1: 検体採取週ごとの全自動遺伝子解析装置等による検査結果	29
参考 2: 各感染症の週ごとの都道府県別定点当たり報告数.....	30
参考 3A: 2026 年 5 月における病原体の報告数	46
参考 3B: 2026 年 5 月における病原体別の検査数、陽性数および陽性率	46
参考 3C: 2026 年 5 月におけるその他の病原体の陽性数	46

1. 患者サーベイランス


1.1. 全国の定点当たり報告数

2026 年第 26 週における ARI は、3,726 カ所の急性呼吸器感染症定点から報告され、定点当たり報告数は 47.47(報告数 176,883 例)であった(図 1)。前週比は 0.98 であった。

急性呼吸器感染症定点から報告されたインフルエンザは 0.08(報告数 310 例)、COVID-19 は 1.08(報告数 4,044 例)であった(図 1A)。なお、報告定点数は 3,739 カ所であった。

小児科定点から報告された RS ウイルス感染症は 0.34(報告数 764 例)、咽頭結膜熱は 0.54(報告数 1,220 例)、ヘルパンギーナは 1.15(報告数 2,592 例)、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は 2.25(報告数 5,076 例)であった(図 1B)。なお、報告定点数は 2,257 カ所であった。最近の動向としては、インフルエンザは前週から増加、COVID-19 は 4 週連続で増加、RS ウイルス感染症、咽頭結膜熱は前週から減少、ヘルパンギーナは 7 週連続で増加、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は 2 週連続で減少した。

図 1: 週ごとの ARI の定点当たり報告数



出典: 感染症発生動向調査(2026 年 7 月 1 日時点, データ範囲: 2025 年 4 月 7 日~2026 年 6 月 28 日)

図 1A: 週ごとのインフルエンザおよび COVID-19 の定点当たり報告数





図 1B: 週ごとの感染症別の定点当たり報告数



出典: 感染症発生動向調査(2026 年 7 月 1 日時点, データ範囲: 2025 年 4 月 7 日～2026 年 6 月 28 日)


注)報告数は、当該週の IDWR で還元したデータを用いた。

1.2. 全国の年齢群別報告数

2026 年第 26 週に定点から報告された ARI の報告数を年齢群別にみると、0-9 歳では 124,790 例(前週比 0.97)、10-59 歳では 40,232 例(前週比 0.97)、60 歳以上は 11,861 例(前週比 0.98)であった(図 2)。

各感染症の年齢群別報告数の推移をみると、インフルエンザはすべての年齢群で増加であった。COVID-19 は 0-59 歳では増加、60 歳以上では減少であった(表 1A)。また RS ウイルス感染症はすべての年齢群で減少であった。咽頭結膜熱は 0-4 歳では減少、5 歳以上では増加であった。ヘルパンギーナは 0-14 歳では増加、15 歳以上では減少であった。A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は 1-4 歳では横ばい、0 歳、5 歳以上では減少であった(表 1B)。週ごとの年齢群別報告数を図 2A および図 2B に示す。なお、インフルエンザ及び COVID-19 における 60 歳以上の報告数はそれぞれ 35 例、174 例であり、このうち 80 歳以上の報告数はそれぞれ 13 例、47 例であった。

図 2: 週ごとの ARI の年齢群別報告数



出典: 感染症発生動向調査(2026 年 7 月 1 日時点, データ範囲: 2025 年 4 月 7 日～2026 年 6 月 28 日)

図 2A: 週ごとのインフルエンザおよび COVID-19 の年齢群別報告数





図 2B: 週ごとの感染症別の年齢群別報告数



出典: 感染症発生動向調査(2026年7月1日時点, データ範囲: 2025年4月7日~2026年6月28日)

注)報告数は、当該週のIDWRで還元したデータを用いた。

表 1A: 当該週におけるインフルエンザおよび COVID-19 の年齢群別報告数

年齢群	インフルエンザ	COVID-19
0-9 歳	116 (1.09)	2,139 (1.33)
10-59 歳	159 (1.28)	1,731 (1.29)
60 歳以上	35 (1.67)	174 (0.93)
計	310 (1.24)	4,044 (1.29)

表 1B: 当該週における感染症別の年齢群別報告数

年齢群	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	ヘルパンギーナ	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
0 歳	191 (0.78)	112 (0.65)	253 (1.12)	33 (0.82)
1-4 歳	550 (0.92)	881 (0.88)	2,119 (1.41)	1,651 (0.95)
5-14 歳	22 (0.56)	208 (1.38)	211 (1.34)	3,110 (0.91)
15 歳以上	1 (0.33)	19 (1.27)	9 (0.56)	282 (0.91)
計	764 (0.86)	1,220 (0.91)	2,592 (1.37)	5,076 (0.92)

出典: 感染症発生動向調査(2026年7月1日時点, データ範囲: 2026年6月22日~2026年6月28日)

注)カッコ内の数値は前週比であり、前週の報告数は当該週の IDWR で還元したデータを用いた。また当該週の年齢階級別報告数は IDWR(定点把握の対象となる 5 類感染症ページ)を参照のこと。

注)前週の報告数が 0 であった場合は、前週比の欄に「―」と表記する。

1.3. 都道府県別の定点当たり報告数

2026 年第 26 週の ARI の定点当たり報告数の上位 3 都道府県は、埼玉県が 67.43 で最も多く、次いで群馬県が 64.53、さらに愛媛県が 63.66 であった(図 3A)。定点当たり報告数が前週を上回った都道府県は 12 件であった(表 2)。定点当たり報告数は 25.46～67.43 であった(図 4)。

定点当たり報告数が多かった上位 3 都道府県は、インフルエンザでは沖縄県、秋田県、大分県であった。COVID-19 では鹿児島県、宮崎県、愛媛県であった。RS ウイルス感染症では沖縄県、長崎県/鹿児島県、佐賀県であった。咽頭結膜熱では奈良県、山形県、鹿児島県であった。ヘルパンギーナでは山口県、島根県、福岡県であった。A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎では愛媛県、山形県、栃木県であった(表 3)。

インフルエンザおよび COVID-19 の定点当たり報告数が 10 を上回った都道府県は、報告されなかった(図 3B)。

表 2: 当該週における都道府県別 ARI の定点当たり報告数

都道府県	報告数	定点当たり報告数	前週比
北海道	6,338	38.18	0.97
青森県	2,053	39.48	0.85
岩手県	2,431	59.29	0.92
宮城県	3,092	56.22	0.97
秋田県	917	36.68	1.16
山形県	1,806	47.53	0.98
福島県	2,605	54.27	0.92
茨城県	3,362	49.44	0.89
栃木県	2,879	61.26	1.07
群馬県	2,904	64.53	0.93
埼玉県	11,733	67.43	1.00
千葉県	9,813	55.13	1.00
東京都	20,431	48.88	1.02
神奈川県	13,881	57.36	0.98
新潟県	1,911	36.75	0.86

都道府県	報告数	定点当たり報告数	前週比
富山県	2,640	55.00	0.98
石川県	2,127	45.26	0.96
福井県	993	25.46	0.92
山梨県	1,035	29.57	0.97
長野県	2,548	50.96	0.93
岐阜県	1,573	34.96	1.01
静岡県	4,068	37.67	0.93
愛知県	9,192	56.39	0.99
三重県	2,172	31.48	0.92
滋賀県	1,524	39.08	0.91
京都府	2,626	43.05	0.85
大阪府	9,226	32.37	0.92
兵庫県	6,982	43.10	0.97
奈良県	1,459	34.74	0.94
和歌山県	1,528	33.96	0.95
鳥取県	1,363	47.00	1.06
島根県	939	46.95	1.04
岡山県	2,339	46.78	0.97
広島県	3,793	40.78	0.95
山口県	3,521	57.72	1.00
徳島県	943	28.58	0.93
香川県	819	35.61	0.96
愛媛県	2,419	63.66	1.08
高知県	1,099	29.70	0.93
福岡県	6,521	53.45	1.02
佐賀県	1,229	51.21	1.10

都道府県	報告数	定点当たり報告数	前週比
長崎県	2,780	54.51	0.97
熊本県	3,591	50.58	0.87
大分県	3,135	54.05	1.10
宮崎県	1,251	44.68	1.06
鹿児島県	3,329	58.40	1.11
沖縄県	1,963	44.61	0.90

出典: 感染症発生動向調査(2026年7月1日時点, データ範囲: 2026年6月22日~2026年6月28日)

注)前週の報告数は、当該週のIDWRで還元したデータを用いた。

注)前週の報告数が0であった場合は、前週比の欄に「―」と表記する。


表 3: 当該週における感染症別定点当たり報告数の上位3都道府県

感染症	都道府県		
インフルエンザ	沖縄県 (0.75)	秋田県 (0.64)	大分県 (0.38)
COVID-19	鹿児島県 (9.19)	宮崎県 (8.89)	愛媛県 (6.37)
RSウイルス感染症	沖縄県 (4.17)	長崎県 (1.87)	鹿児島県 (1.87)
咽頭結膜熱	奈良県 (1.71)	山形県 (1.00)	鹿児島県 (0.97)
ヘルパンギーナ	山口県 (4.34)	島根県 (3.18)	福岡県 (2.83)
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	愛媛県 (5.90)	山形県 (5.08)	栃木県 (4.52)

出典: 感染症発生動向調査(2026年7月1日時点, データ範囲: 2026年6月22日~2026年6月28日)

注)定点当たり報告数が同値であった場合には、都道府県番号の昇順により記載する。

図 3A: 当該週における都道府県別 ARI の定点当たり報告数




出典: 感染症発生動向調査(2026 年 7 月 1 日時点, データ範囲: 2026 年 6 月 22 日~2026 年 6 月 28 日)


図 3B: 当該週における各感染症の都道府県別定点当たり報告数

インフルエンザ


COVID-19




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱



ヘルパンギーナ









A群溶血性レンサ球菌咽頭炎















出典: 感染症発生動向調査(2026 年 7 月 1 日時点, データ範囲: 2026 年 6 月 22 日~2026 年 6 月 28 日)







図 4: 週ごとの都道府県別 ARI の定点当たり報告数






















香川県




愛媛県




高知県




福岡県








佐賀県



長崎県





出典: 感染症発生動向調査(2026年7月1日時点, データ範囲: 2025年4月7日~2026年6月28日)


注)ARI 定点点あたり報告数は、当該週のIDWRで還元したデータを用いた。

1.4. 全国のインフルエンザおよび COVID-19 の新規入院患者数

2026 年第 26 週に基幹定点から報告されたインフルエンザは 14 例で前週と比較して横ばいであった。COVID-19 は 115 例で前週と比較して 25 例減少した(図 5)。

年齢群別でみると、インフルエンザでは 0-9 歳で 4 例、10-59 歳で 2 例、60-69 歳で 1 例、70-79 歳で 3 例、80 歳以上で 4 例であった。COVID-19 では 0-9 歳で 46 例、10-59 歳で 20 例、60-69 歳で 5 例、70-79 歳で 18 例、80 歳以上で 26 例であった(表 4)。

図 5: 基幹定点医療機関から報告されたインフルエンザおよび COVID-19 の新規入院患者数



出典: 感染症発生動向調査(2026 年 7 月 1 日時点, データ範囲: 2025 年 4 月 7 日~2026 年 6 月 28 日)

表 4: 当該週における基幹定点医療機関から報告された新規入院患者数

年齢群	インフルエンザ	COVID-19
0-9 歳	4 (1.33)	46 (0.81)
10-59 歳	2 (0.40)	20 (0.80)
60-69 歳	1 (1.00)	5 (1.00)
70-79 歳	3 (0.75)	18 (1.00)
80 歳以上	4 (4.00)	26 (0.74)
計	14 (1.00)	115 (0.82)

出典: 感染症発生動向調査(2026 年 7 月 1 日時点, データ範囲: 2026 年 6 月 22 日~2026 年 6 月 28 日)

注)カッコ内の数値は前週比であり、前週の報告数は当該週の IDWR で還元したデータを用いた。また当該週の年齢階級別報告数は IDWR(定点把握の対象となる 5 類感染症ページ)を参照のこと。

注)前週の報告数が 0 であった場合は、前週比の欄に「—」と表記。

2. 病原体サーベイランスの状況

2.1. 全国の病原体別報告数

急性呼吸器感染症病原体定点(以下、ARI 病原体定点)で 2026 年第 26 週に採取され、集計時点までに報告された検体数は 80 件であった。そのうち、インフルエンザウイルス A 型およびインフルエンザウイルス B 型は 0 件、SARS-CoV-2 および RS ウイルスは 1 件が陽性であった(図 6)。


病原体別の陽性率は、インフルエンザウイルス A 型およびインフルエンザウイルス B 型が 0.0%、SARS-CoV-2 および RS ウイルスが 1.2%であった(図 7)。

第 21 週(5 月 18 日~5 月 24 日)に採取された検体は概ね結果登録が反映されており、その数は北海道・東北地方では 95 件、関東地方では 116 件、北陸地方では 61 件、東海地方では 13 件、近畿地方では 75 件、中国地方では 104 件、四国地方では 10 件、九州・沖縄地方では 60 件であった。最も多く検出された病原体は、四国地方ではヒトメタニューモウイルスおよびライノ/エンテロウイルス、北海道・東北地方、関東地方、北陸地方、東海地方、近畿地方、中国地方、九州・沖縄地方ではライノ/エンテロウイルスであった(図 8)。

また検体採取週ごとの医療機関における全自動遺伝子解析装置等による検査結果を参考表に示す。第26週はパラインフルエンザウイルス1型が2件、ライノ／エンテロウイルスが1件、ヒトメタニューモウイルスが1件登録された。第25週はパラインフルエンザウイルス3型とライノ／エンテロウイルスが新たに追加された。

2026年7月1日時点で、2026年5月における病原体の報告数と病原体別の検査数、陽性数および陽性率は参考3A、3Bおよび3Cに示す。病原体検出あり検体は1,363件、検出なしは658件であった。最も多かった病原体はライノ／エンテロウイルスであり、789件が陽性であった。

図6: 検体採取週ごとの病原体別報告数



出典: 感染症発生動向調査(2026年7月1日時点, データ範囲: 2025年4月7日～2026年6月28日)

注) 報告週ではなく検体採取週で集計していることに注意が必要である。

注) 集計時点における報告数であるため、過去の週報で掲載された値とは必ずしも一致しないことに注意が必要である。


注) 1つの検体から複数の病原体が検出された場合は、検出された全ての病原体を計上している。

注) ライノ／エンテロウイルスは、ライノウイルスまたはエンテロウイルスが検出されたものである。

注) その他は、凡例に示されている病原体以外が検出されたものである。

注) 検査結果が検出なし、また検査結果の掲載がない週及び地域については、病原体が検出されなかった場合もあるが、検査項目によっては未実施の場合も含まれることに注意が必要である。

図 7: 検体採取週ごとの病原体別陽性率



出典: 感染症発生動向調査(2026年7月1日時点, データ範囲: 2025年4月7日~2026年6月28日)


注)陽性率は、対象病原体の検査実施検体数を分母として算出($(\text{陽性数} / \text{検査実施数}) \times 100$)される。





注)報告週ではなく検体採取週で集計していることに注意が必要である。


注)集計時点における報告数であるため、過去の週報で掲載された値とは必ずしも一致しないことに注意が必要である。

図 8: 検体採取週ごとの全国および地域別、病原体別報告数

全国







出典: 感染症発生動向調査(2026年7月1日時点, データ範囲: 2025年4月7日~2026年6月28日)

注) 報告週ではなく検体採取週で集計していることに注意が必要である。

注) 集計時点における報告数であるため、過去の週報で掲載された値とは必ずしも一致しないことに注意が必要である。

注) 1つの検体から複数の病原体が検出された場合は、検出された全ての病原体を計上している。

注) ライノ／エンテロウイルスは、ライノウイルスまたはエンテロウイルスが検出されたものである。

注) その他は、凡例に示されている病原体以外が検出されたものである。

注) 検査結果が検出なし、また検査結果の掲載がない週及び地域については、病原体が検出されなかった場合もあるが、検査項目によっては未実施の場合も含まれることに注意が必要である。

2.2. SARS-CoV-2 ゲノムサーベイランス

※今週の掲載はありません。

注意事項

本報では、急性呼吸器感染症定点および小児科定点としてあらかじめ指定された医療機関から週単位で報告された患者数を全国および都道府県ごとに集計した数値を用いている。都道府県別あるいは性別・年齢階級別報告数の詳細については感染症発生動向調査週報(IDWR)を参照されたい。なお、本報に掲載されている数値は暫定値であり、年報での数値とは必ずしも一致しない。

患者サーベイランスの集計には感染症発生動向調査に報告されたデータのうち直近 1 週間は集計日時点のデータを、それ以前は最初の集計時点のデータを再掲している。遅れて報告されたり、修正されたりする場合があるため、集計値は暫定値であることに注意が必要である。

週ごとの感染症の動向は定点当たり報告数を用いて評価し、年齢群別の動向は報告数を用いて評価している。

病原体サーベイランスの集計では、全ての週に関して集計時点のデータを掲載している。自治体/地方衛生研究所によって集められた検体に対する病原体検査項目が異なることがある。また、自治体/地方衛生研究所によって検査実施および報告に要する日数が異なるため、検体採取週における病原体検出数は遅れて報告される、あるいは修正されることがあり集計値は暫定値であることに注意が必要である。特に直近は遅れ報告や修正による集計値の変動が大きいことを考慮して 5 週前の数字を用いて記述している。

2025 年 4 月 7 日(第 15 週)より、感染症発生動向調査事業実施要綱上の定点の選定基準が変更され、インフルエンザ/COVID-19 定点(約 5,000 医療機関)から急性呼吸器感染症定点(約 3,000 医療機関)に変更、小児科定点は約 3,000 医療機関から約 2,000 医療機関に変更された。急性呼吸器感染症定点は、内科定点に比べ小児科定点が多く選択されている。定点から報告されたインフルエンザ、COVID-19 症例に占める各年齢群の割合については、小児に偏る可能性がある。一方、経時的な流行全体の傾向(トレンド)と水準(レベル)の把握、年齢群ごとの傾向と水準の評価の観点においては影響を与えない。

年末・年始(第 52 週～第 1 週頃)、ゴールデンウィーク(第 18 週頃)、お盆(第 33 週頃)、シルバーウィーク(第 39 週頃)等の週では、休日に伴う医療機関への受診行動の変化や医療体制の変化をうけて報告数が減少する傾向があり、解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

従来の警報・注意報は保健所ごとの報告数を用いて検討・設計されており、定点数の設計および定点医療機関が変更された 2025 年 4 月 7 日以降の患者サーベイランスに直ちに当てはめることはできない。急性呼吸器感染症定点の運用時でのインフルエンザをはじめとする各感染症の警報・注意報といったアラートについてはデータの蓄積の上で検討を進める。なお、このような限界を理解したうえで従前の警報・注意報をコミュニケーションとして使用することを妨げるものではない。

急性呼吸器感染サーベイランスは 2025 年 4 月から開始されており、報告数のレベルの評価にはデータの蓄積を要する。その動向の推移を注視していく必要がある。

地域の定義

北海道・東北地方: 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方: 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
北陸地方: 新潟県、富山県、石川県、福井県
東海地方: 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地方: 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地方: 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国地方: 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄地方: 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

参考サイト

●感染症発生動向調査週報(IDWR)ページ

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

●病原微生物検出情報(IASR)ページ

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

●急性呼吸器感染症サーベイランスの各システムにおける報告例の年齢群別分布の検討、2025 年第 15～26 週

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/pathogens/vol46/549/549d01.html>

●国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 感染症情報提供サイト

<https://id-info.jihs.go.jp/>

・インフルエンザ

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/a/influenza/index.html>

・新型コロナウイルス感染症

<https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/covid-19/index.html>

・RS ウイルス感染症

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/alphabet/rs/010/rs-intro.html>

・咽頭結膜熱

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/a/adenovirus/index.html>

・ヘルパンギーナ

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/herpangina/index.html>

●厚生労働省 急性呼吸器感染症(ARI)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

・急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスに係る具体的な方針について (PDF: 1096KB)

<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001272561.pdf>

・急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(令和七年厚生労働省告示第二百九十六号) (PDF: 292KB)

<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001595583.pdf>

・インフルエンザ(総合ページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html

・新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

・RS ウイルス感染症 Q&A(令和6年5月 31 日改訂)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs_qa.html

・咽頭結膜熱

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/kenkou/kekkaku-kansenshou/pcf.html

・ヘルパンギーナ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/kenkou/kekkaku-kansenshou/herpangina.html

●グラフで見る感染症流行状況

<https://www.jihs.go.jp/content10/030/Dashboard.html>

- 新型コロナウイルスのゲノムサーベイランス(検疫検体:入国者検疫検体を含む)について
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/45/532/article/030/index.html>
- SARS-CoV-2 変異株について(新型コロナウイルスゲノムサーベイランスによる全国の系統別検出状況)
<https://id-info.jihs.go.jp/relevant-information/covid-19/variants/index.html>
- 都道府県番号について(PDF: 68KB)
<https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/07/dl/tp0727-1d.pdf>

参考 1: 検体採取週ごとの全自動遺伝子解析装置等による検査結果

全自動遺伝子解析装置を設置している医療機関における病原体検査の結果をモニタリングするために、任意の医療機関の協力により集められた検査結果である。

病原体	第 21 週	第 22 週	第 23 週	第 24 週	第 25 週	第 26 週
インフルエンザウイルス A/H1 亜型	0	0	0	0	0	0
インフルエンザウイルス A/H1pdm09 亜型	0	0	0	0	0	0
インフルエンザウイルス A/H3 亜型	0	0	0	0	0	0
インフルエンザウイルス A(亜型不明)	0	0	0	0	0	0
インフルエンザウイルス B 型	0	0	0	0	0	0
SARS-CoV-2	1	0	2	2	1	0
RS ウイルス	3	0	0	1	0	0
パラインフルエンザウイルス 1 型	0	0	0	0	0	2
パラインフルエンザウイルス 2 型	0	0	0	0	0	0
パラインフルエンザウイルス 3 型	0	1	0	0	1	0
パラインフルエンザウイルス 4 型	0	0	0	0	0	0
パラインフルエンザウイルス(型不明)	2	0	0	1	0	0
ライノ／エンテロウイルス	12	7	10	5	2	1
ヒトメタニューモウイルス	9	10	6	1	0	1
アデノウイルス	3	1	3	3	0	0
コロナウイルス HKU1	0	0	0	0	0	0
コロナウイルス NL63	0	0	0	0	0	0
コロナウイルス 229E	0	0	0	0	0	0
コロナウイルス OC43	0	0	0	0	0	0

病原体	第21週	第22週	第23週	第24週	第25週	第26週
百日咳菌	0	0	0	0	0	0
パラ百日咳菌	0	0	0	0	0	0
クラミジア・ニューモニエ	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ・ニューモニエ	1	0	1	0	0	0

出典: 感染症発生動向調査(2026年7月1日時点, データ範囲: 2026年5月18日~2026年6月28日)


注)医療機関からの任意の協力による報告であるため報告数は参考値である。第21週から第26週にかけてご協力いただいた医療機関は、17医療機関である。

注)ライノ／エンテロウイルスは、ライノウイルスまたはエンテロウイルスが検出されたものである。


注)表記が「cov」または「flu」のみであるものについては、本表の集計対象から除外している。

参考 2: 各感染症の週ごとの都道府県別定点当たり報告数


北海道




青森県




岩手県




宮城県




秋田県




山形県




福島県




茨城県




栃木県




群馬県




埼玉県




千葉県




東京都




神奈川県




新潟県




富山県




石川県




福井県




山梨県




長野県




岐阜県




静岡県




愛知県




三重県




滋賀県




京都府




大阪府




兵庫県




奈良県




和歌山県




鳥取県




島根県




岡山県




広島県




山口県




徳島県




香川県




愛媛県




高知県




福岡県




佐賀県




長崎県




熊本県




大分県




宮崎県



鹿児島県



沖縄県



出典: 感染症発生動向調査(2026年7月1日時点, データ範囲: 2025年4月7日~2026年6月28日)

注) 報告数は、当該週のIDWRで還元したデータを用いた。

参考 3A: 2026 年 5 月における病原体の報告数

	報告数
検出あり	1,363
検出なし	658

参考 3B: 2026 年 5 月における病原体別の検査数、陽性数および陽性率

病原体	検査数	陽性数	陽性率
インフルエンザウイルス A 型	2,018	6	0.3%
インフルエンザウイルス B 型	2,018	12	0.6%
SARS-CoV-2	2,019	66	3.3%
RS ウイルス	2,018	79	3.9%
パラインフルエンザウイルス	2,019	201	10.0%
ヒトメタニューモウイルス	2,019	266	13.2%
ライノ／エンテロウイルス	2,019	789	39.1%
アデノウイルス	2,018	194	9.6%

参考 3C: 2026 年 5 月におけるその他の病原体の陽性数

参考3B に示されている病原体以外に報告されたものを以下に示す。

病原体	陽性数
ヒトコロナウイルス OC43	5
ヒトボカウイルス	4
ヒトコロナウイルス HKU1	3
ヒトコロナウイルス 229E	2
ヒトヘルペスウイルス	2
肺炎マイコプラズマ	2
ヒトコロナウイルス NL63	1
化膿レンサ球菌	1
病原体名記載なし	8

出典: 感染症発生動向調査(2026 年 7 月 1 日時点, データ範囲: 2026 年 5 月 1 日~2026 年 5 月 31 日)

注)病原体の報告数は、検出病原体の有無を集計している。

注)各病原体の検査数は、陽性・陰性および未実施のうち、未実施を除いた陽性・陰性を集計している。

注)参考3Cに示されている病原体に対する検査の実施や報告は自治体／地方衛生研究所で異なるため、報告数に対する割合は、参考3Bで示す陽性率とは一致しないことに注意が必要である。

注)報告月ではなく検体採取月で集計していることに注意が必要である。

注)集計時点における報告数であるため、過去の週報で掲載された値とは必ずしも一致しないことに注意が必要である。

注)1つの検体から複数の病原体が検出された場合は、検出された全ての病原体を計上している。

注)ライノ／エンテロウイルスは、ライノウイルスまたはエンテロウイルスが検出されたものである。