

急性呼吸器感染症サーベイランス週報:

2026 年第 31 週(2026 年 7 月 27 日~2026 年 8 月 2 日)

Acute Respiratory Infection Surveillance Weekly Report: Epidemiologic Situational Awareness

Week 31, 2026

本報は全国から報告された急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection、以下、ARI という)のサーベイランス報告を精査してまとめ、地方自治体等で感染症対策に従事する皆様や国民の皆様に、広く疫学情報を提供・還元することを目的としています。ARI、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、小児科および内科からなる急性呼吸器感染症定点から、RS ウイルス感染症、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、小児科定点から報告されています。患者サーベイランスでは集計日に直近 1 週間のデータを集計し、それ以外は、以前のデータを再掲しています。病原体サーベイランスでは、集計日に全ての期間のデータを集計しています。週ごとの「傾向(トレンド)」と「水準(レベル)」を踏まえ、感染の流行の状況について、解釈を行っています。巻末に本報に関する注意事項を記載してあります。なお報告数は暫定値であり、変更の可能性があることにご注意下さい。

今週の状況(概要):

2026 年第 31 週(7 月 27 日~8 月 2 日)における ARI の定点当たり報告数は 44.96(報告数 167,420 例)であり、前週(7 月 20 日~7 月 26 日)と比較して増加した。ARI の定点当たり報告数が前週を上回った都道府県は 38 件であった。各感染症の定点当たり報告数では、COVID-19 は 1.70、インフルエンザは 0.37、ヘルパンギーナは 1.59、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は 1.37、RS ウイルス感染症は 0.51、咽頭結膜熱は 0.30 であった。年齢群別にみると、報告数が最も多かった年齢群は、インフルエンザでは 10-59 歳、COVID-19 では 0-9 歳、RS ウイルス感染症、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナでは 1-4 歳、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎では 5-14 歳であった。また、新規入院患者数は、インフルエンザは 57 例で前週と比較して 10 例増加した。COVID-19 は 268 例で前週と比較して 27 例増加した。

2026 年第 31 週に検体が採取されて集計時点までに報告されたもののうち、SARS-CoV-2 は 8 件、RS ウイルスは 3 件、インフルエンザウイルス A 型およびインフルエンザウイルス B 型は 0 件であった。

2026 年 8 月 5 日時点で、2026 年 6 月における病原体検出あり検体は 1,909 件、検出なしは 756 件であった。最も多かった病原体はライノ/エンテロウイルスであり、948 件が陽性であった。

目次


今週の状況(概要):	1
1. 患者サーベイランス	3
1.1. 全国の定点当たり報告数	3
1.2. 全国の年齢群別報告数	5
1.3. 都道府県別の定点当たり報告数	8
1.4. 全国のインフルエンザおよび COVID-19 の新規入院患者数	21
2. 病原体サーベイランスの状況	22
2.1. 全国の病原体別報告数	22
2.2. SARS-CoV-2 ゲノムサーベイランス	26
注意事項	27
地域の定義	27
参考サイト	28
参考 1: 検体採取週ごとの全自動遺伝子解析装置等による検査結果	29
参考 2: 各感染症の週ごとの都道府県別定点当たり報告数	31
参考 3A: 2026 年 6 月における病原体の報告数	47
参考 3B: 2026 年 6 月における病原体別の検査数、陽性数および陽性率	47
参考 3C: 2026 年 6 月におけるその他の病原体の陽性数	47

1. 患者サーベイランス

1.1. 全国の定点当たり報告数

2026 年第 31 週における ARI は、3,724 カ所の急性呼吸器感染症定点から報告され、定点当たり報告数は 44.96(報告数 167,420 例)であった(図 1)。前週比は 1.05 であった。
急性呼吸器感染症定点から報告されたインフルエンザは 0.37(報告数 1,384 例)、COVID-19 は 1.70(報告数 6,332 例)であった(図 1A)。なお、報告定点数は 3,733 カ所であった。
小児科定点から報告された RS ウイルス感染症は 0.51(報告数 1,155 例)、咽頭結膜熱は 0.30(報告数 685 例)、ヘルパンギーナは 1.59(報告数 3,579 例)、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は 1.37(報告数 3,094 例)であった(図 1B)。なお、報告定点数は 2,252 カ所であった。最近の動向としては、インフルエンザは 6 週連続で増加、COVID-19、RS ウイルス感染症、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は前週から増加した。

図 1: 週ごとの ARI の定点当たり報告数



出典: 感染症発生動向調査(2026 年 8 月 5 日時点, データ範囲: 2025 年 5 月 12 日~2026 年 8 月 2 日)

図 1A: 週ごとのインフルエンザおよび COVID-19 の定点当たり報告数





図 1B: 週ごとの感染症別の定点当たり報告数



出典: 感染症発生動向調査(2026 年 8 月 5 日時点, データ範囲: 2025 年 5 月 12 日~2026 年 8 月 2 日)


注)報告数は、当該週の IDWR で還元したデータを用いた。

1.2. 全国の年齢群別報告数

2026 年第 31 週に定点から報告された ARI の報告数を年齢群別にみると、0-9 歳では 118,303 例(前週比 1.05)、10-59 歳では 35,609 例(前週比 1.02)、60 歳以上は 13,508 例(前週比 1.16)であった(図 2)。

各感染症の年齢群別報告数の推移をみると、インフルエンザはすべての年齢群で増加であった。COVID-19 は 0-9 歳、60 歳以上では増加、10-59 歳では減少であった(表 1A)。また RS ウイルス感染症は 0-14 歳では増加、15 歳以上では減少であった。咽頭結膜熱は 0 歳では増加、1-14 歳では横ばい、15 歳以上では減少であった。ヘルパンギーナは 0-4 歳では横ばい、5 歳以上では減少であった。A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は 0-4 歳では増加、5-14 歳では横ばい、15 歳以上では減少であった(表 1B)。週ごとの年齢群別報告数を図 2A および図 2B に示す。なお、インフルエンザおよび COVID-19 における 60 歳以上の報告数はそれぞれ 144 例、587 例であり、このうち 80 歳以上の報告数はそれぞれ 42 例、186 例であった。

図 2: 週ごとの ARI の年齢群別報告数



出典: 感染症発生動向調査(2026 年 8 月 5 日時点, データ範囲: 2025 年 5 月 12 日~2026 年 8 月 2 日)

図 2A: 週ごとのインフルエンザおよび COVID-19 の年齢群別報告数





図 2B: 週ごとの感染症別の年齢群別報告数



出典: 感染症発生動向調査(2026年8月5日時点, データ範囲: 2025年5月12日~2026年8月2日)

注)報告数は、当該週のIDWRで還元したデータを用いた。

表 1A: 当該週におけるインフルエンザおよび COVID-19 の年齢群別報告数

年齢群	インフルエンザ	COVID-19
0-9 歳	612 (1.74)	3,775 (1.26)
10-59 歳	628 (1.40)	1,970 (0.87)
60 歳以上	144 (1.69)	587 (1.29)
計	1,384 (1.56)	6,332 (1.11)

表 1B: 当該週における感染症別の年齢群別報告数

年齢群	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	ヘルパンギーナ	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
0 歳	320 (1.14)	64 (1.31)	345 (1.00)	36 (1.33)
1-4 歳	807 (1.12)	488 (1.05)	2,707 (1.04)	1,101 (1.08)
5-14 歳	26 (1.30)	125 (1.02)	506 (0.89)	1,789 (1.04)
15 歳以上	2 (0.40)	8 (0.53)	21 (0.70)	168 (0.77)
計	1,155 (1.12)	685 (1.05)	3,579 (1.01)	3,094 (1.04)

出典: 感染症発生動向調査(2026年8月5日時点, データ範囲: 2026年7月27日~2026年8月2日)

注)カッコ内の数値は前週比であり、前週の報告数は当該週の IDWR で還元したデータを用いた。また当該週の年齢階級別報告数は IDWR(定点把握の対象となる 5 類感染症ページ)を参照のこと。
 注)前週の報告数が 0 であった場合は、前週比の欄に「―」と表記する。

1.3. 都道府県別の定点当たり報告数

2026 年第 31 週の ARI の定点当たり報告数の上位 3 都道府県は、群馬県が 72.16 で最も多く、次いで埼玉県が 66.01、さらに栃木県が 64.26 であった(図 3A)。定点当たり報告数が前週を上回った都道府県は 38 件であった(表 2)。定点当たり報告数は 27.86～72.16 であった(図 4)。

定点当たり報告数が多かった上位 3 都道府県は、インフルエンザでは沖縄県、青森県、埼玉県であった。COVID-19 では島根県、山口県、愛媛県であった。RS ウイルス感染症では沖縄県、鹿児島県、福岡県であった。咽頭結膜熱では島根県、京都府、福岡県であった。ヘルパンギーナでは群馬県、山形県、三重県であった。A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎では愛媛県、島根県、鳥取県であった(表 3)。
 インフルエンザおよび COVID-19 の定点当たり報告数が 10 を上回った都道府県は、報告されなかった(図 3B)。

表 2: 当該週における都道府県別 ARI の定点当たり報告数

都道府県	報告数	定点当たり報告数	前週比
北海道	5,987	36.28	1.24
青森県	2,067	39.75	1.09
岩手県	2,502	59.57	1.21
宮城県	3,008	54.69	1.03
秋田県	738	29.52	1.01
山形県	2,025	53.29	1.18
福島県	2,318	48.29	1.06
茨城県	3,469	51.01	1.06
栃木県	3,020	64.26	1.03
群馬県	3,247	72.16	1.16
埼玉県	11,617	66.01	1.03
千葉県	8,750	48.61	1.05
東京都	17,914	42.96	1.08
神奈川県	12,498	52.51	0.99
新潟県	2,326	44.73	1.16

都道府県	報告数	定点当たり報告数	前週比
富山県	2,402	51.11	1.07
石川県	2,335	49.68	1.12
福井県	1,130	28.97	0.98
山梨県	975	27.86	1.07
長野県	2,615	52.30	1.14
岐阜県	1,599	35.53	1.06
静岡県	4,395	40.69	1.03
愛知県	9,308	57.10	1.04
三重県	2,560	37.65	1.04
滋賀県	1,624	41.64	1.01
京都府	2,526	40.10	1.04
大阪府	8,533	29.94	1.03
兵庫県	6,614	40.83	1.04
奈良県	1,324	31.52	0.98
和歌山県	1,511	33.58	1.05
鳥取県	1,209	41.69	1.02
島根県	932	46.60	1.23
岡山県	2,292	45.84	1.08
広島県	3,574	38.43	1.05
山口県	3,156	51.74	1.13
徳島県	949	28.76	0.95
香川県	917	39.87	1.09
愛媛県	2,138	56.26	0.98
高知県	1,370	37.03	1.23
福岡県	4,805	39.39	0.86
佐賀県	1,144	47.67	1.02

都道府県	報告数	定点当たり報告数	前週比
長崎県	2,562	50.24	1.09
熊本県	3,094	44.20	0.94
大分県	2,669	46.02	0.99
宮崎県	1,012	36.14	0.88
鹿児島県	2,632	46.18	1.04
沖縄県	2,028	46.09	1.04

出典: 感染症発生動向調査(2026年8月5日時点, データ範囲: 2026年7月27日~2026年8月2日)

注)前週の報告数は、当該週のIDWRで還元したデータを用いた。

注)前週の報告数が0であった場合は、前週比の欄に「―」と表記する。


表 3: 当該週における感染症別定点当たり報告数の上位3都道府県

感染症	都道府県		
インフルエンザ	沖縄県 (2.20)	青森県 (1.52)	埼玉県 (0.89)
COVID-19	島根県 (6.30)	山口県 (6.00)	愛媛県 (5.53)
RSウイルス感染症	沖縄県 (3.54)	鹿児島県 (2.19)	福岡県 (1.56)
咽頭結膜熱	島根県 (1.00)	京都府 (0.62)	福岡県 (0.60)
ヘルパンギーナ	群馬県 (5.04)	山形県 (3.73)	三重県 (2.93)
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	愛媛県 (3.33)	島根県 (3.27)	鳥取県 (3.05)

出典: 感染症発生動向調査(2026年8月5日時点, データ範囲: 2026年7月27日~2026年8月2日)

注)定点当たり報告数が同値であった場合には、都道府県番号の昇順により記載する。


図 3A: 当該週における都道府県別 ARI の定点当たり報告数




出典: 感染症発生動向調査(2026年8月5日時点, データ範囲: 2026年7月27日~2026年8月2日)

図 3B: 当該週における各感染症の都道府県別定点当たり報告数


インフルエンザ




COVID-19




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱



ヘルパンギーナ










A群溶血性レンサ球菌咽頭炎















出典: 感染症発生動向調査(2026年8月5日時点, データ範囲: 2026年7月27日~2026年8月2日)







図 4: 週ごとの都道府県別 ARI の定点当たり報告数



































出典: 感染症発生動向調査(2026年8月5日時点, データ範囲: 2025年5月12日~2026年8月2日)

注)ARI 定点あたり報告数は、当該週のIDWRで還元したデータを用いた。

1.4. 全国のインフルエンザおよび COVID-19 の新規入院患者数

2026 年第 31 週に基幹定点から報告されたインフルエンザは 57 例で前週と比較して 10 例増加した。COVID-19 は 268 例で前週と比較して 27 例増加した(図 5)。
年齢群別でみると、インフルエンザでは 0-9 歳で 20 例、10-59 歳で 6 例、60-69 歳で 7 例、70-79 歳で 13 例、80 歳以上で 11 例であった。COVID-19 では 0-9 歳で 107 例、10-59 歳で 38 例、60-69 歳で 20 例、70-79 歳で 43 例、80 歳以上で 60 例であった(表 4)。

図 5: 基幹定点医療機関から報告されたインフルエンザおよび COVID-19 の新規入院患者数



出典: 感染症発生動向調査(2026 年 8 月 5 日時点, データ範囲: 2025 年 5 月 12 日~2026 年 8 月 2 日)

表 4: 当該週における基幹定点医療機関から報告された新規入院患者数

年齢群	インフルエンザ	COVID-19
0-9 歳	20 (1.33)	107 (0.98)
10-59 歳	6 (0.46)	38 (1.15)
60-69 歳	7 (7.00)	20 (1.33)
70-79 歳	13 (1.62)	43 (1.26)
80 歳以上	11 (1.10)	60 (1.20)
計	57 (1.21)	268 (1.11)

出典: 感染症発生動向調査(2026 年 8 月 5 日時点, データ範囲: 2026 年 7 月 27 日~2026 年 8 月 2 日)

注)カッコ内の数値は前週比であり、前週の報告数は当該週の IDWR で還元したデータを用いた。また当該週の年齢階級別報告数は IDWR(定点把握の対象となる 5 類感染症ページ)を参照のこと。

注)前週の報告数が 0 であった場合は、前週比の欄に「―」と表記。

2. 病原体サーベイランスの状況

2.1. 全国の病原体別報告数

急性呼吸器感染症病原体定点(以下、ARI 病原体定点)で 2026 年第 31 週に採取され、集計時点までに報告された検体数は 93 件であった。そのうち、インフルエンザウイルス A 型およびインフルエンザウイルス B 型は 0 件、SARS-CoV-2 は 8 件、RS ウイルスは 3 件の陽性であった(図 6)。

病原体別の陽性率は、インフルエンザウイルス A 型およびインフルエンザウイルス B 型が 0.0%、SARS-CoV-2 が 8.6%、RS ウイルスが 3.2%であった(図 7)。


第 26 週(6 月 22 日~6 月 28 日)に採取された検体は概ね結果登録が反映されており、その数は北海道・東北地方では 92 件、関東地方では 113 件、北陸地方では 58 件、東海地方では 10 件、近畿地方では 77 件、中国地方では 91 件、四国地方では 8 件、九州・沖縄地方では 78 件であった。最も多く検出された病原体は、北海道・東北地方、東海地方、近畿地方ではパラインフルエンザウイルス、関東地方、北陸地方、中国地方、四国地方、九州・沖縄地方ではライノ/エンテロウイルスであった(図 8)。

また検体採取週ごとの医療機関における全自動遺伝子解析装置等による検査結果を参考表に示す。第 31

週はライノ／エンテロウイルスが 2 件、SARS-CoV-2 が 1 件、パラインフルエンザウイルス 1 型が 1 件、ヒトメタニューモウイルスが 1 件登録された。第 30 週はパラインフルエンザウイルス 1 型が新たに追加された。

2026 年 8 月 5 日時点で、2026 年 6 月における病原体の報告数と病原体別の検査数、陽性数および陽性率は参考 3A、3B および 3C に示す。病原体検出あり検体は 1,909 件、検出なしは 756 件であった。最も多かった病原体はライノ／エンテロウイルスであり、948 件が陽性であった。

図 6: 検体採取週ごとの病原体別報告数



出典: 感染症発生動向調査(2026 年 8 月 5 日時点, データ範囲: 2025 年 5 月 12 日～2026 年 8 月 2 日)

注) 報告週ではなく検体採取週で集計していることに注意が必要である。

注) 集計時点における報告数であるため、過去の週報で掲載された値とは必ずしも一致しないことに注意が必要である。


注) 1 つの検体から複数の病原体が検出された場合は、検出された全ての病原体を計上している。

注) ライノ／エンテロウイルスは、ライノウイルスまたはエンテロウイルスが検出されたものである。

注) その他は、凡例に示されている病原体以外が検出されたものである。

注) 検査結果が検出なし、また検査結果の掲載がない週および地域については、病原体が検出されなかった場合もあるが、検査項目によっては未実施の場合も含まれることに注意が必要である。

図 7: 検体採取週ごとの病原体別陽性率



出典: 感染症発生動向調査(2026年8月5日時点, データ範囲: 2025年5月12日~2026年8月2日)


注)陽性率は、対象病原体の検査実施検体数を分母として算出($(\text{陽性数} / \text{検査実施数}) \times 100$)される。





注)報告週ではなく検体採取週で集計していることに注意が必要である。


注)集計時点における報告数であるため、過去の週報で掲載された値とは必ずしも一致しないことに注意が必要である。

図 8: 検体採取週ごとの全国および地域別、病原体別報告数

全国







出典: 感染症発生動向調査(2026年8月5日時点, データ範囲: 2025年5月12日~2026年8月2日)

注) 報告週ではなく検体採取週で集計していることに注意が必要である。

注) 集計時点における報告数であるため、過去の週報で掲載された値とは必ずしも一致しないことに注意が必要である。

注) 1つの検体から複数の病原体が検出された場合は、検出された全ての病原体を計上している。

注) ライノ／エンテロウイルスは、ライノウイルスまたはエンテロウイルスが検出されたものである。

注) その他は、凡例に示されている病原体以外が検出されたものである。

注) 検査結果が検出なし、また検査結果の掲載がない週および地域については、病原体が検出されなかった場合もあるが、検査項目によっては未実施の場合も含まれることに注意が必要である。

2.2. SARS-CoV-2 ゲノムサーベイランス

※今週の掲載はありません。

注意事項

本報では、急性呼吸器感染症定点および小児科定点としてあらかじめ指定された医療機関から週単位で報告された患者数を全国および都道府県ごとに集計した数値を用いている。都道府県別あるいは性別・年齢階級別報告数の詳細については感染症発生動向調査週報(IDWR)を参照されたい。なお、本報に掲載されている数値は暫定値であり、年報での数値とは必ずしも一致しない。

患者サーベイランスの集計には感染症発生動向調査に報告されたデータのうち直近 1 週間は集計日時点のデータを、それ以前は最初の集計時点のデータを再掲している。遅れて報告されたり、修正されたりする場合があるため、集計値は暫定値であることに注意が必要である。

週ごとの感染症の動向は定点当たり報告数を用いて評価し、年齢群別の動向は報告数を用いて評価している。前週との比較は小数点第2位までの定点当たり報告数を用いており、IDWR とは必ずしも一致しない。

病原体サーベイランスの集計では、全ての週に関して集計時点のデータを掲載している。自治体/地方衛生研究所によって集められた検体に対する病原体検査項目が異なることがある。また、自治体/地方衛生研究所によって検査実施および報告に要する日数が異なるため、検体採取週における病原体検出数は遅れて報告される、あるいは修正されることがあり集計値は暫定値であることに注意が必要である。特に直近は遅れ報告や修正による集計値の変動が大きいことを考慮して 5 週前の数字を用いて記述している。

2025 年 4 月 7 日(第 15 週)より、感染症発生動向調査事業実施要綱上の定点の選定基準が変更され、インフルエンザ/COVID-19 定点(約 5,000 医療機関)から急性呼吸器感染症定点(約 3,000 医療機関)に変更、小児科定点は約 3,000 医療機関から約 2,000 医療機関に変更された。急性呼吸器感染症定点は、内科定点に比べ小児科定点が多く選択されている。定点から報告されたインフルエンザ、COVID-19 症例に占める各年齢群の割合については、小児に偏る可能性がある。一方、経時的な流行全体の傾向(トレンド)と水準(レベル)の把握、年齢群ごとの傾向と水準の評価の観点においては影響を与えない。

年末・年始(第 52 週～第 1 週頃)、ゴールデンウィーク(第 18 週頃)、お盆(第 33 週頃)、シルバーウィーク(第 39 週頃)等の週では、休日に伴う医療機関への受診行動の変化や医療体制の変化をうけて報告数が減少する傾向があり、解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

従来の警報・注意報は保健所ごとの報告数を用いて検討・設計されており、定点数の設計および定点医療機関が変更された 2025 年 4 月 7 日以降の患者サーベイランスに直ちに当てはめることはできない。急性呼吸器感染症定点の運用時でのインフルエンザをはじめとする各感染症の警報・注意報といったアラートについてはデータの蓄積の上で検討を進める。なお、このような限界を理解したうえで従前の警報・注意報をコミュニケーションとして使用することを妨げるものではない。

急性呼吸器感染サーベイランスは 2025 年 4 月から開始されており、報告数のレベルの評価にはデータの蓄積を要する。その動向の推移を注視していく必要がある。

地域の定義

北海道・東北地方: 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方: 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
北陸地方: 新潟県、富山県、石川県、福井県
東海地方: 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿地方: 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地方: 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国地方: 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州・沖縄地方: 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

参考サイト

●感染症発生動向調査週報(IDWR)ページ

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>

●病原微生物検出情報(IASR)ページ

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

●急性呼吸器感染症サーベイランスの各システムにおける報告例の年齢群別分布の検討、2025 年第 15～26 週

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/pathogens/vol46/549/549d01.html>

●国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 感染症情報提供サイト

<https://id-info.jihs.go.jp/>

・インフルエンザ

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/a/influenza/index.html>

・新型コロナウイルス感染症

<https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/covid-19/index.html>

・RS ウイルス感染症

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/alphabet/rs/010/rs-intro.html>

・咽頭結膜熱

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/a/adeno/index.html>

・ヘルパンギーナ

<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/herpangina/index.html>

・A 群溶血性レンサ球菌感染症

<https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/group-a-streptococcal-infection/index.html>

●厚生労働省 急性呼吸器感染症(ARI)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

・急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスに係る具体的な方針について (PDF: 1096KB)

<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001272561.pdf>

・急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(令和七年厚生労働省告示第二百九十六号) (PDF: 292KB)

<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001595583.pdf>

・インフルエンザ(総合ページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/infuenza/index.html

・新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

・RS ウイルス感染症 Q&A(令和 8 年 4 月 27 日改訂)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/rsv_qa.htm

・咽頭結膜熱

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/pcf.html

・ヘルパンギーナ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/herpangina.html

●グラフで見る感染症流行状況

<https://www.jihs.go.jp/content10/030/Dashboard.html>

●新型コロナウイルスのゲノムサーベイランス(検疫検体:入国者検疫検体を含む)について

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/45/532/article/030/index.html>

●SARS-CoV-2 変異株について(新型コロナウイルスゲノムサーベイランスによる全国の系統別検出状況)

<https://id-info.jihs.go.jp/relevant-information/covid-19/variants/index.html>

●入国時感染症ゲノムサーベイランス

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54515.html

●入国時感染症ゲノムサーベイランスについて(報告)(PDF: 1.9MB)

<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001719502.pdf>

●都道府県番号について(PDF: 68KB)

<https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/07/dl/tp0727-1d.pdf>

参考 1: 検体採取週ごとの全自動遺伝子解析装置等による検査結果

全自動遺伝子解析装置を設置している医療機関における病原体検査の結果をモニタリングするために、任意の医療機関の協力により集められた検査結果である。

病原体	第 26 週	第 27 週	第 28 週	第 29 週	第 30 週	第 31 週
インフルエンザウイルス A/H1 亜型	0	0	0	0	0	0
インフルエンザウイルス A/H1pdm09 亜型	0	0	0	0	0	0
インフルエンザウイルス A/H3 亜型	0	0	0	0	0	0
インフルエンザウイルス A(亜型不明)	0	0	0	0	0	0
インフルエンザウイルス B 型	0	0	0	0	0	0
SARS-CoV-2	0	1	0	1	0	1
RS ウイルス	1	1	2	2	0	0
パラインフルエンザウイルス 1 型	4	0	1	1	1	1
パラインフルエンザウイルス 2 型	0	0	0	1	0	0
パラインフルエンザウイルス 3 型	0	1	1	1	0	0
パラインフルエンザウイルス 4 型	0	0	1	0	0	0
パラインフルエンザウイルス(型不明)	0	1	5	3	0	0
ライノ／エンテロウイルス	4	7	7	8	0	2
ヒトメタニューモウイルス	1	2	2	3	1	1

病原体	第 26 週	第 27 週	第 28 週	第 29 週	第 30 週	第 31 週
アデノウイルス	0	2	1	3	0	0
コロナウイルス HKU1	0	0	0	0	0	0
コロナウイルス NL63	0	0	0	0	0	0
コロナウイルス 229E	0	0	0	0	0	0
コロナウイルス OC43	0	0	0	0	0	0
百日咳菌	0	0	0	0	0	0
パラ百日咳菌	0	0	0	0	0	0
クラミジア・ニューモニエ	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ・ニューモニエ	1	1	0	1	0	0

出典: 感染症発生動向調査(2026 年 8 月 5 日時点, データ範囲: 2026 年 6 月 22 日~2026 年 8 月 2 日)


注)医療機関からの任意の協力による報告であるため報告数は参考値である。第 26 週から第 31 週にかけてご協力いただいた医療機関は、15 医療機関である。

注)ライノ／エンテロウイルスは、ライノウイルスまたはエンテロウイルスが検出されたものである。


注)表記が「cov」または「flu」のみであるものについては、本表の集計対象から除外している。

参考 2: 各感染症の週ごとの都道府県別定点当たり報告数


北海道




青森県




岩手県




宮城県




秋田県




山形県




福島県




茨城県




栃木県




群馬県




埼玉県




千葉県




東京都




神奈川県




新潟県




富山県




石川県




福井県




山梨県




長野県




岐阜県




静岡県




愛知県




三重県




滋賀県




京都府




大阪府




兵庫県




奈良県




和歌山県




鳥取県




島根県




岡山県




広島県




山口県




徳島県




香川県




愛媛県




高知県




福岡県




佐賀県




長崎県




熊本県




大分県




宮崎県



鹿児島県



沖縄県



出典: 感染症発生動向調査(2026年8月5日時点, データ範囲: 2025年5月12日～2026年8月2日)

注) 報告数は、当該週のIDWRで還元したデータを用いた。

参考 3A: 2026 年 6 月における病原体の報告数

	報告数
検出あり	1,909
検出なし	756

参考 3B: 2026 年 6 月における病原体別の検査数、陽性数および陽性率

病原体	検査数	陽性数	陽性率
インフルエンザウイルス A 型	2,611	7	0.3%
インフルエンザウイルス B 型	2,611	5	0.2%
SARS-CoV-2	2,659	169	6.4%
RS ウイルス	2,658	92	3.5%
パラインフルエンザウイルス	2,659	514	19.3%
ヒトメタニューモウイルス	2,659	349	13.1%
ライノ／エンテロウイルス	2,659	948	35.7%
アデノウイルス	2,611	290	11.1%

参考 3C: 2026 年 6 月におけるその他の病原体の陽性数

参考3B に示されている病原体以外に報告されたものを以下に示す。

病原体	陽性数
ヒトボカウイルス	20
肺炎マイコプラズマ	6
パレコウイルス	3
ヒトコロナウイルス OC43	3
化膿レンサ球菌	3
ヒトコロナウイルス HKU1	2
ヒトコロナウイルス 229E	1
肺炎クラミジア	1
病原体名記載なし	11

出典: 感染症発生動向調査(2026 年 8 月 5 日時点, データ範囲: 2026 年 6 月 1 日~2026 年 6 月 30 日)

注)病原体の報告数は、検出病原体の有無を集計している。

注)各病原体の検査数は、陽性・陰性および未実施のうち、未実施を除いた陽性・陰性を集計している。

注)参考3Cに示されている病原体に対する検査の実施や報告は自治体／地方衛生研究所で異なるため、報告数に対する割合は、参考3Bで示す陽性率とは一致しないことに注意が必要である。

注)報告月ではなく検体採取月で集計していることに注意が必要である。

注)集計時点における報告数であるため、過去の週報で掲載された値とは必ずしも一致しないことに注意が必要である。

注)1つの検体から複数の病原体が検出された場合は、検出された全ての病原体を計上している。

注)ライノ／エンテロウイルスは、ライノウイルスまたはエンテロウイルスが検出されたものである。