


2024/2025 シーズン流行株のワクチン（類似）株抗血清との反応性
2025年2月から8月までに検体から分離された株（海外株も含む）

A(H3N2)

抗 A/ディストリクトオブ
コロンビア/27/2023血清


抗血清：細胞分離株



n=94

抗 A/クロアチア/
10136RV/2023血清

卵分離株



n=94


ホモHI価から ■：2倍以内 ■：4倍 ■：8倍以上低下

2025/2026 シーズン流行株のワクチン（類似）株抗血清との反応性
2025年9月以降に検体から分離された株（海外株も含む）

A(H3N2)

抗 A/ディストリクトオブ
コロンビア/27/2023血清


抗血清：細胞分離株



n=316

抗 A/クロアチア/
10136RV/2023血清

卵分離株



n=316


ホモHI価から ■：2倍以内 ■：4倍 ■：8倍以上低下

2025/2026 シーズン流行株のサブクレードK株抗血清との反応性
2025年9月以降に検体から分離された株（海外株も含む）

A(H3N2)

抗 A/東京/EIS13-355/
2025血清


抗血清：細胞分離株



n=248

抗 A/東京/EIS13-355/
2025血清

卵分離株



n=160

ホモHI価から ■ : 2倍以内 ■ : 4倍 ■ : 8倍以上低下

細胞分離株および卵分離株A/東京/EIS13-355/2025は、それぞれ細胞分離株A/Darwin/1415/2025および卵分離株A/Darwin/1454/2025と抗原性類似株である。