

◎ 8月7日より	福岡	太宰府 9月4日	10	90% (9/10頭)	44% (4/9頭)	8月7日	タ(10頭/10頭)がHI抗体陽性。2-ME感受性抗体は保持していなかった。
◎ 8月21日より	高知	中村 9月4日	10	40% (4/10頭)	100% (2/2頭)	8月21日	8月21日は50%のブタ(5頭/10頭)がHI抗体陽性。そのうち40%(2頭/5頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 9月4日より	愛媛	大洲 9月17日	20	25% (5/20頭)	0% (0/5頭)	9月4日	9月4日は75%のブタ(15頭/20頭)がHI抗体陽性。36%(5/14頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
	香川	坂出 9月10日	20	15% (3/20頭)		8月20日	9月3日は陰性(0頭/20頭)。
◎ 8月20日より	広島	三次 9月5日	10	100% (10/10頭)	75% (3/4頭)	8月20日	8月27日は100%のブタ(10頭/10頭)がHI抗体陽性。14%(1/7頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
	島根	島根 9月4日	20	20% (4/20頭)	100% (4/4頭)	9月4日	8月21日は陰性(0頭/20頭)。
	和歌山	8月3日	13	15% (2/13頭)			7月26日～31日は陰性(0頭/15頭)。
	奈良	奈良 9月11日	23	0%			9月4日も陰性(0頭/19頭)。
	兵庫	西播磨 9月3日	15	0%			8月27日は陰性(0頭/15頭)。
	滋賀	滋賀 9月6日	10	0%			8月31日も陰性(0頭/10頭)。
	三重	松阪 9月11日	10	10% (1/10頭)			8月28日は10%のブタ(1頭/10頭)がHI抗体陽性。2-ME感受性抗体は保持していなかった。
◎ 8月13日より	静岡	小笠 9月3日	10	90% (9/10頭)	44% (4/9頭)	7月23日	8月23日は100%のブタ(10頭/10頭)がHI抗体陽性。そのうち44%(4/9頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
	山梨	山梨 9月5日	10	0%			8月29日も陰性(0頭/10頭)。
◎ 9月5日より	石川	金沢 9月5日	10	100% (10/10頭)	11% (1/9頭)	9月5日	8月27日も陰性(0頭/10頭)。
	富山	新湊 9月11日	20	30% (6/20頭)	83% (5/6頭)	9月11日	9月4日は陰性(0頭/20頭)。
	新潟	新潟 9月10日	10	0%			8月27日は陰性(0頭/10頭)。
	神奈川	平塚 9月4日	20	10% (2/20頭)	100% (1/1頭)	9月4日	8月28日は陰性(0頭/20頭)。
	東京	八王子 9月3日 ～6日	50	0%			8月27日～30日は陰性(0頭/50頭)。
◎ 9月3日より	千葉	旭 9月10日	20	85% (17/20頭)	100% (17/17頭)	9月3日	9月3日は100%のブタ(20頭/20頭)がHI抗体陽性。そのうち80%(16頭/20頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
	群馬	玉村 8月7日	16	0%			7月24日は6%のブタ(1頭/16頭)がHI抗体陽性。
	栃木	宇都宮 9月3日	20	0%			8月27日は5%のブタ(1頭/20頭)がHI抗体陽性。
	茨城	水戸 8月29日	12	0%			8月22日も陰性(0頭/12頭)。

	秋田	秋田 8月16日	12	0%			8月9日も陰性(0頭/12頭)。
	宮城	仙南 9月3日	26	0%			8月20日は陰性(0頭/28頭)。
	北海道	道南 8月16日	10	0%			8月2日も陰性(0頭/10頭)。
	北海道	道央 8月27日	10	0%			8月20日も陰性(0頭/10頭)。
◎	日本脳炎ウイルス汚染が推定された地域 (今シーズンの調査で、調査ブタにおいて、1：10以上のHI抗体保有率が50%を越え、かつ2-ME感受性抗体が検出された地域)						
☆	日本脳炎HI抗体及び2-ME感受性抗体の保有率以外の情報より日本脳炎ウイルス汚染が推定された地域						
*	2-ME感受性抗体の検査は、1：40以上のHI抗体価を示した血清について調査した。						
		今シーズンの調査で、ブタのHI抗体保有率が80%を越えた地域					
		今シーズンの調査で、ブタのHI抗体保有率が50%を越え、かつ2-ME感受性抗体が検出された地域					
		今シーズンの調査で、ブタの新鮮感染(2-ME感受性抗体)が検出された地域					

国立感染症研究所 ウイルス第一部
国立感染症研究所 感染症情報センター