

ブタの日本脳炎HI抗体保有状況調査速報 －2003年第11報－

日本脳炎は、日本脳炎ウイルスに感染したヒトのうち数百人に一人が発症すると考えられている重篤な脳炎である（文献1）。ヒトへの感染は、日本脳炎ウイルスを媒介する蚊（コガタアカイエカ）が日本脳炎ウイルスに感染したブタを吸血し、その後ヒトを刺すことにより起こる。

感染症流行予測調査事業では、全国各地のブタ血清中の日本脳炎ウイルスに対する抗体を赤血球凝集抑制法（Hemagglutination inhibition test；HI法）を用いて測定することにより、間接的に日本脳炎ウイルスの蔓延状況を調査している。前年の秋以降に生まれたブタが日本脳炎ウイルスに対する抗体を保有し、さらに2-メルカプトエタノール（2-ME）感受性抗体（IgM抗体）を保有している場合、そのブタは最近日本脳炎ウイルスに感染したと考えられる。

1960年代までは、毎年夏から秋にかけて多数の日本脳炎患者が発生しており（文献2）、ブタの感染状況から日本脳炎ウイルスが蔓延している地域に多くの患者発生がみられた。Konnoらは、当時調査したブタの半数以上が日本脳炎ウイルスに感染していると、約2週間後からその地域に日本脳炎患者が発生してくると報告している（文献3）。現在では、日本脳炎ワクチンの普及や生活環境の変化等により、ブタの感染状況と患者発生は必ずしも一致していない。近年における日本脳炎患者発生数は毎年数名程度であるが、ブタの感染状況から日本脳炎ウイルスが蔓延していると推測される地域では、ヒトへの感染の危険性が高くなっていると考えられる。

本速報は、日本脳炎ウイルスの感染に対する注意を喚起するものである。また、昨年度から推定汚染地域の表記を行わないこととしたため、それぞれの居住地域における日本脳炎に関する情報に注意し、日本脳炎ウイルスが蔓延していると推測される地域においては、予防接種を受けていない人、乳幼児、高齢者は蚊に刺されないようにするなど注意が必要である。

No. 2003-11							
国立感染症研究所ウイルス第一部・感染症情報センター発 2003年9月18日							
下記の都道府県における屠畜場のブタの日本脳炎抗体保有率は次の通りである。							
	都道府県	と畜場	採血月日	検査数	HI抗体陽性%	2-ME感受性%	その他
◎ 4/30	沖縄	北部	8月26日	25	40% (10/25頭)	80% (4/5頭)	8月19日の調査では52%のブタ(13/25頭)がHI抗体陽性であった。
◎ 5/13	沖縄	中南部	8月26日	25	100% (25/25頭)	0% (0/23頭)	8月19日の調査では64%のブタ(16/25頭)がHI抗体陽性であり、86%(6/7頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 8/4	鹿児島		9月1日	10	40% (4/10頭)	0% (0/4頭)	8月25日の調査では10%のブタ(1/10頭)がHI抗体陽性であり、100%(1/1頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 7/28	宮崎	都城	9月8日	11	55% (6/11頭)	83% (5/6頭)	9月1日の調査では64%のブタ(7/11頭)がHI抗体陽性であり、14%(1/7頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 8/4	大分		9月3日	20	75% (15/20頭)	13% (2/15頭)	8月22日の調査では5%のブタ(1/20頭)がHI抗体陽性であり、2-ME感受性抗体は保持していなかった(0/1頭)。
◎ 7/28	熊本	熊本	9月16日	20	50% (10/20頭)	22% (2/9頭)	9月2日の調査では40%のブタ(8/20頭)がHI抗体陽性であり、25%(2/8頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 8/4	長崎	諫早	9月16日	18	56% (10/18頭)	0% (0/10頭)	9月2日の調査では70%のブタ(14/20頭)がHI抗体陽性であり、45%(5/12頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 7/8	佐賀	佐賀	9月2日	10	90% (9/10頭)	33% (2/6頭)	8月26日の調査では50%のブタ(5/10頭)がHI抗体陽性であり、60%(3/5頭)が2-ME感受性抗体

							を保持していた。
◎ 7/15	福岡	太宰府	9月16日	10	100% (10/10頭)	0% (0/10頭)	9月2日の調査では100%のブタ(10/10頭)がHI抗体陽性であり、2-ME感受性抗体は保持していなかった(0/10頭)。
◎ 7/1	高知	宿毛	9月1日	10	100% (10/10頭)	0% (0/10頭)	
◎ 8/11	愛媛	大洲	9月1日	20	15% (3/20頭)	100% (3/3頭)	8月25日の調査ではHI抗体陰性(0/20頭)であった。
◎ 8/4	香川	坂出	9月8日	20	60% (12/20頭)	100% (11/11頭)	9月1日の調査では5%のブタ(1/20頭)がHI抗体陽性であり、抗体価は1:10であった。
◎ 8/4	広島	三次	9月10日	10	30% (3/10頭)	100% (3/3頭)	9月3日の調査ではHI抗体陰性(0/10頭)であった。
◎ 8/1	島根	島根	8月29日	20	0% (0/20頭)		
◎ 8/25	兵庫	西播磨	9月1日	15	53% (8/15頭)	88% (7/8頭)	
◎ 7/18	滋賀	滋賀	8月29日	10	40% (4/10頭)		今回の調査ではHI抗体価は4頭とも1:10であった。
◎ 7/22	三重	松阪	9月2日	10	0% (0/10頭)		
	静岡	小笠	9月1日	10	0% (0/10頭)		8月25日の調査でもHI抗体陰性(0/10頭)であった。
	山梨	山梨	9月1日	10	0% (0/10頭)		
	石川	金沢	9月10日	10	0% (0/10頭)		9月3日の調査でもHI抗体陰性(0/10頭)であった。
◎ 7/8	富山	新湊	9月9日	20	0% (0/20頭)		9月2日の調査では15%のブタ(3/20頭)がHI抗体陽性であり、2-ME感受性抗体は保持していなかった(0/1頭)。
	新潟	新潟	9月8日	10	0% (0/10頭)		9月1日の調査でもHI抗体陰性(0/10頭)であった。
	神奈川	神奈川	8月26日	20	0% (0/20頭)		8月19日の調査でもHI抗体陰性(0/20頭)であった。
◎ 8/18	千葉		9月8日	10	0% (0/10頭)		9月1日の調査ではHI抗体陰性(0/10頭)であった。
◎ 7/22	群馬	群馬	8月19日	20	0% (0/20頭)		
	栃木	宇都宮	9月16日	20	0% (0/20頭)		9月1日の調査でもHI抗体陰性(0/20頭)であった。
	茨城	水戸	9月10日	10	0% (0/10頭)		9月3日の調査でもHI抗体陰性(0/10頭)であった。
	秋田	秋田	9月12日	10	0% (0/10頭)		9月3日の調査でもHI抗体陰性(0/10頭)であった。
	宮城	仙台	8月26日	30	0% (0/30頭)		
	北海道	早来	8月28日	10	0% (0/10頭)		

* HI抗体は、1：10以上を陽性とした。

** 2-ME感受性抗体については、HI抗体が1：40以上であったものについて検査した。

		ブタの日本脳炎ウイルスに対するHI抗体保有率が80%を越えた地区。					
		ブタに2-ME感受性抗体が検出され、しかも日本脳炎ウイルスHI抗体陽性率が50%を越えた地区。					

	ブタに2-ME感受性抗体が検出された地区。
--	-----------------------

◎ : 今シーズンの調査でHI抗体陽性のブタが認められた地区。数字は陽性となった調査日を示す。

- 文献
1. Southam, C. M., Serological studies of encephalitis in Japan. II. Inapparent infection by Japanese B encephalitis virus. *Journal of Infectious diseases*. 1956. 99: 163-169.
 2. 松永泰子, 矢部貞雄, 谷口清州, 中山幹男, 倉根一郎. 日本における近年の日本脳炎患者発生状況—厚生省伝染病流行予測調査および日本脳炎確認患者個人票 (1982~1996) に基づく解析—. *感染症学雑誌*. 1999. 73: 97-103.
 3. Konno, J., Endo, K., Agatsuma, H. and Ishida, Nakao. Cyclic outbreaks of Japanese encephalitis among pigs and humans. *American Journal of epidemiology*. 1966. 84: 292-300.

国立感染症研究所 ウイルス第一部
国立感染症研究所 感染症情報センター
