

ブタの日本脳炎HI抗体保有状況調査速報 －2005年第11報－

日本脳炎は、日本脳炎ウイルスに感染したヒトのうち数百人に一人が発症すると考えられている重篤な脳炎である（文献1）。ヒトへの感染は、日本脳炎ウイルスを媒介する蚊（コガタアカイエカ）が日本脳炎ウイルスに感染したブタを吸血し、その後ヒトを刺すことにより起こる。

感染症流行予測調査事業では、全国各地のブタ血清中の日本脳炎ウイルスに対する抗体を赤血球凝集抑制法（Hemagglutination inhibition test；HI法）を用いて測定することにより、間接的に日本脳炎ウイルスの蔓延状況を調査している。前年の秋以降に生まれたブタが日本脳炎ウイルスに対する抗体を保有し、さらに2-メルカプトエタノール（2-ME）感受性抗体（IgM抗体）を保有している場合、そのブタは最近日本脳炎ウイルスに感染したと考えられる。

1960年代までは、毎年夏から秋にかけて多数の日本脳炎患者が発生しており（文献2、3）、ブタの感染状況から日本脳炎ウイルスが蔓延している地域に多くの患者発生がみられた。Konnoらは、当時調査したブタの半数以上が日本脳炎ウイルスに感染していると、約2週間後からその地域に日本脳炎患者が発生してくると報告している（文献4）。現在では、日本脳炎ワクチンの普及や生活環境の変化等により、ブタの感染状況と患者発生は必ずしも一致していない。近年における日本脳炎患者発生数は毎年数名程度であるが、ブタの感染状況から日本脳炎ウイルスが蔓延していると推測される地域では、ヒトへの感染の危険性が高くなっていると考えられる。

本速報は、日本脳炎ウイルスの感染に対する注意を喚起するものである。また、それぞれの居住地域における日本脳炎に関する情報にも注意し、日本脳炎ウイルスが蔓延していると推測される地域においては、予防接種を受けていない人、乳幼児、高齢者は蚊に刺されないようにするなど注意が必要である。

No. 2005-11 ⇒ [都道府県別日本脳炎抗体保有状況（地図）](#)

国立感染症研究所ウイルス第1部・感染症情報センター発 2005年9月12日

下記の都道府県におけると畜場のブタの日本脳炎抗体保有率は次の通りである。

HI抗体	2-ME感受性抗体	都道府県	と畜場所在地	採血月日	検査数	HI抗体陽性率*	2-ME感受性抗体陽性率**	その他
◎ 4/26	◎ 5/10	沖縄	北部	8月16日	25	0% (0/25)		7月19日採血分の調査でHI抗体陽性率が50%を超えた。 8月9日採血分（前回）の調査ではHI抗体陽性のブタは確認されなかった。
◎ 4/26	◎ 5/17	沖縄	中南部	8月16日	25	0% (0/25)		8月9日採血分（前回）の調査では4%（1/25）のブタがHI抗体陽性であったが、2-ME感受性抗体を保持しているブタは認められなかった。
◎ 7/25	◎ 7/25	鹿児島		9月7日	20	65% (13/20)	8% (1/13)	9月7日採血分の調査でHI抗体陽性率が50%を超えた。 8月29日採血分（前回）の調査ではHI抗体陽性のブタは確認されなかった。
◎ 6/27	◎ 7/11	宮崎	都城 都農	8月22日	20	30% (6/20)	50% (3/6)	8月1日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月8日採血分（前回）の調査では100%（20/20）のブタがHI抗体陽性であり、50%（9/18）のブタが2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 7/13	◎ 7/13	大分		8月26日	20	80% (16/20)	13% (2/16)	7月22日採血分の調査でHI抗体陽性率が50%を超えた。 8月3日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月17日採血分（前回）の調査では55%（11/20）のブタがHI抗体陽性であり、27%（3/11）のブタが2-ME感受性抗体を保持していた。
								8月8日採血分の調査でHI抗体陽性率が50%を超えた。

◎ 8/1	◎ 8/1	熊本	菊池	9月5日	20	90% (18/20)	44% (8/18)	8月22日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月29日採血分(前回)の調査では80%(16/20)のブタがHI抗体陽性であったが、2-ME感受性抗体を保持しているブタは認められなかった。
◎ 7/12	◎ 7/12	長崎	佐世保	8月23日	20	100% (20/20)	100% (20/20)	8月9日採血分の調査でHI抗体陽性率が50%を超えた。 8月17日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月17日採血分(前回)の調査では95%(19/20)のブタがHI抗体陽性であり、67%(12/18)のブタが2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 7/5	◎ 7/26	佐賀	多久	8月30日	10	100% (10/10)	20% (2/10)	8月2日採血分の調査でHI抗体陽性率が50%を超えた。 8月23日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月23日採血分(前回)の調査では80%(8/10)のブタがHI抗体陽性であり、13%(1/8)のブタが2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 7/19	◎ 7/26	福岡	太宰府	8月30日	10	100% (10/10)	10% (1/10)	7月26日採血分の調査でHI抗体陽性率が50%を超えた。 8月2日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月23日採血分(前回)の調査では100%(10/10)のブタがHI抗体陽性であり、10%(1/10)のブタが2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 6/23	◎ 6/23	高知	四万十	8月24日	10	80% (8/10)	0% (0/8)	6月23日採血分の調査でHI抗体陽性率が50%を超えた。 7月13日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月16日採血分(前回)の調査では100%(10/10)のブタがHI抗体陽性であったが、2-ME感受性抗体を保持しているブタは認められなかった。
◎ 7/5	◎ 7/5	愛媛	大洲	9月6日	20	75% (15/20)	20% (3/15)	8月16日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月23日採血分(前回)の調査では5%(1/20)のブタがHI抗体陽性であり、100%(1/1)のブタが2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 7/25	◎ 8/1	香川	坂出	8月29日	10	100% (10/10)	80% (8/10)	7月25日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月22日採血分(前回)の調査では90%(9/10)のブタがHI抗体陽性であり、100%(6/6)のブタが2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 8/23	◎ 8/23	徳島	鳴門	8月30日	10	100% (10/10)	10% (1/10)	8月30日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月23日採血分(前回)の調査では10%(1/10)のブタがHI抗体陽性であり、100%(1/1)のブタが2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 7/5	◎ 7/12	広島	三次	8月23日	10	100% (10/10)	10% (1/10)	7月12日採血分の調査でHI抗体陽性率が50%を超えた。 7月26日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月9日採血分(前回)の調査では20%(2/10)のブタがHI抗体陽性で

									あり、100% (2/2) のブタが2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 7/27	◎ 7/27	島根	大田	8月3日	15	0% (0/15)			7月27日採血分（前回）の調査では13% (2/15) のブタがHI抗体陽性であり、100% (2/2) のブタが2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 7/26		鳥取	大山	8月4日	10	0% (0/10)			7月26日採血分（前回）の調査では10% (1/10) のブタがHI抗体陽性であったが、2-ME感受性抗体を保持しているブタは認められなかった。
◎ 8/4	◎ 8/4	兵庫		9月1日	16	100% (16/16)	0% (0/16)		8月25日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月25日採血分（前回）の調査では100% (13/13) のブタがHI抗体陽性であったが、2-ME感受性抗体を保持しているブタは認められなかった。
◎ 8/19	◎ 8/19	滋賀	日野	9月1日	10	0% (0/10)			8月19日採血分の調査でHI抗体陽性率が50%を超えた。 8月25日採血分（前回）の調査では50% (5/10) のブタがHI抗体陽性であったが、2-ME感受性抗体を保持しているブタは認められなかった。
◎ 7/25	◎ 8/3	三重	松阪	9月5日	25	60% (15/25)	7% (1/15)		8月18日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月29日採血分（前回）の調査ではHI抗体陽性のブタは確認されなかった。
◎ 7/13	◎ 7/13	静岡	菊川	9月5日	10	100% (10/10)	22% (2/9)		7月25日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月25日採血分（前回）の調査では80% (8/10) のブタがHI抗体陽性であったが、2-ME感受性抗体を保持しているブタは認められなかった。
		山梨	笛吹	8月10日	10	0% (0/10)			7月27日採血分（前回）の調査でもHI抗体陽性のブタは確認されなかった。
◎ 8/11	◎ 8/11	石川	金沢	8月22日	10	0% (0/10)			8月11日採血分の調査でHI抗体陽性率が80%を超えた。 8月11日採血分（前回）の調査では100% (10/10) のブタがHI抗体陽性であり、30% (3/10) のブタが2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 7/12	◎ 8/17	富山	新湊	9月6日	20	60% (12/20)	90% (9/10)		9月6日採血分の調査でHI抗体陽性率が50%を超えた。 8月30日採血分（前回）の調査では35% (7/20) のブタがHI抗体陽性であり、100% (4/4) のブタが2-ME感受性抗体を保持していた。
		新潟	新潟	9月5日	10	0% (0/10)			8月29日採血分（前回）の調査でもHI抗体陽性のブタは確認されなかった。
		神奈川	厚木	8月30日	20	0% (0/20)			8月25日採血分（前回）の調査でもHI抗体陽性のブタは確認されなかった。
◎ 8/1		千葉	旭	8月29日	20	0% (0/20)			8月22日採血分（前回）の調査でもHI抗体陽性のブタは確認されなかった。
		埼玉	さいたま	8月4日	10	0% (0/10)			7月27日採血分（前回）の調査でもHI抗体陽性のブタは確認されなかった。

◎ 8/29		栃木	宇都宮	8月29日	10	30% (3/10)		8月16日採血分（前回）の調査ではHI抗体陽性のブタは確認されなかった。
		秋田	秋田	8月26日	10	0% (0/10)		8月17日採血分（前回）の調査でもHI抗体陽性のブタは確認されなかった。
		宮城	仙台	8月23日	20	0% (0/20)		8月9日採血分（前回）の調査でもHI抗体陽性のブタは確認されなかった。
		青森	十和田 田舎館	8月16日 8月15日	20	0% (0/20)		8月1日採血分（前回）の調査でもHI抗体陽性のブタは確認されなかった。
		北海道	八雲	8月23日	10	0% (0/10)		8月19日採血分（前回）の調査でもHI抗体陽性のブタは確認されなかった。

* HI抗体は、1：10以上を陽性とした。

** 2-ME感受性抗体は、HI抗体価が1：40以上（北海道・東北地方は1：10以上）であったものについて検査した。

2-ME処理後のHI抗体価が1：40から<1：10に下がった検体は2-ME感受性抗体陽性と判定した。

	今シーズンの調査でブタの日本脳炎ウイルスに対するHI抗体陽性率が80%を超えた地区。
	今シーズンの調査でブタに2-ME感受性抗体が検出され、さらにHI抗体陽性率が50%を超えた地区。
	今シーズンの調査でブタに2-ME感受性抗体が検出された地区。
◎	今シーズンの調査でHI抗体陽性あるいは2-ME感受性抗体陽性のブタが認められた地区。 数字は陽性となった採血日を示す。

- 文献
1. Southam, C. M., Serological studies of encephalitis in Japan. II. Inapparent infection by Japanese B encephalitis virus. *Journal of Infectious diseases*. 1956. 99: 163-169.
 2. 松永泰子, 矢部貞雄, 谷口清州, 中山幹男, 倉根一郎. 日本における近年の日本脳炎患者発生状況—厚生省伝染病流行予測調査および日本脳炎確認患者個人票（1982～1996）に基づく解析—. *感染症学雑誌*. 1999. 73; 97-103.
 3. 新井 智, 多屋馨子, 岡部信彦, 高崎智彦, 倉根一郎. わが国における日本脳炎の疫学と今後の対策について. *臨床とウイルス*. 2004. 32(1): 13-22.
 4. Konno, J., Endo, K., Agatsuma, H. and Ishida, Nakao. Cyclic outbreaks of Japanese encephalitis among pigs and humans. *American Journal of epidemiology*. 1966. 84: 292-300.